

seminibus asperis. (2) in pratis frequens. — Fl. fr. 4. p. 64. — Fuchs. hist. 821. ic. (v. v.)

2. T. MAJUS (Jacq. aust. t. 29.) foliis glabris planis basi latoribus, pedunculis apice incrassatis, involuci corollæ radio longioris squamis 10-12 lanceolato-ovatis acuminatis, seminibus echinatis. 2/ in apricis Galliæ mediæ, australis occidentalisque. — Fl. fr. 4. p. 64. Lam. ill. t. 646. f. 1. (v. v.)
3. T. HIRSUTUM (Gou. monsp. 342.) caule foliisque basi supernè tomentosis, pedunculis apice incrassatis, involucris corollæ radio non longioribus. (2)? in sterilibus apricis Galliæ mediterraneæ. — Fl. fr. 4. p. 64. Garid. aix 466. t. 95. Praeced. varietas? (v. s.)

* * *Floribus cœruleis vel violaceis.*

4. T. PORRIFOLIUM (L. sp. 1110.) caule stricto glabro, foliis lineariformibus basi dilatatis, involuci squamis longè acuminatis corollâ planissimâ duplò longioribus. (2) in pratis provinciarum australiorum — Fl. fr. 4. p. 65. Jacq. ic. rar. t. 159. (v. v.)
5. T. CROCIFOLIUM (L. sp. 1110.) caule stricto tomentoso, foliis linearisubulatis, involuci squamis lanceolatis acutis corollâ sublongioribus. (2) in montibus subherbosis Galliæ australis. — Fl. fr. 4. p. 65. — Col. ecphr. t. 230. (v. v. DC.)

LXXXVI. THRINCIA Roth. cat. bot. 1. p. 98. DC. fl. fr. 4. p. 51.

Involucrum imbricatum; receptaculum favosum; semina disci pappo sessili plumoso et inæquali donata, radii breviter papposa, pappo abortivo.

1. T. HIRTA (Roth. 1. c.) foliis lanceolatis sinuato-dentatis hirtis, scapo 1-floro, involucro glabro basi squamulis aucto. 2/ in sterilibus arenosis ad vias. — Fl. fr. 4. p. 51. Leontodon hirtum L. sp. 1123. — C. Bauh. prod. p. 63. ic. (v. v.)
2. T. HISPIDA (Roth. cat. 1. p. 99.) foliis lanceolatis obtusis dentatis hispidis pilis furcatis, scapo 1-floro piloso, involucro canescente nudo. (1) in lapidosis et arenosis provinciarum australium occidentaliumque. — Fl. fr. 4. p. 52. Hyoseris taraxacoides Vill. dauph. 3. t. 25. (v. s.)
3. T. TUBEROSA (DC. fl. fr. 4. p. 52.) radice tuberosâ, foliis lyratis hirtis scabris, scapo unifloro nudo apice hirto. 2/ in pratis circâ Monspelium, Nicæam, Aquas Sextias, Massiliam. — Leontodon tuberosum L. sp. 1123. — Lob. ic. t. 232. f. 1. (v. s.)

LXXXVII. LEONTODON Juss. gen. p. 170. DC. fl. fr. 4. p. 53. — Apargia Schreb. Wild.

Involucrum imbricatum; receptaculum favosum; pappus plumbosus sessilis, pilis aliis squamosis aliis sericeis.

1. L. INCANUM (DC. fl. fr. 4. p. 56.) foliis oblongis subdenticulatis cano-scabris pilis apice radiantibus, scapo unifloro pubescente, involuci squamis linearibus acuminatis pubescentibus. 2/ in pascuis excelsis Alpium Delphinensis, circâ Monspelium ex cl. Benth. — Hieracium incanum L. Jacq. austr. t. 287. — Vill. 3. t. 24. (v. s.)
2. L. SQUAMOSUM (Lam. dict. 3. p. 529.) foliis oblongis glabris subdentatis, scapo unifloro squamoso supernè hirto, involuci hirti squamis linearibus acutis. 2/ in pascuis montosis. — Fl. fr. 4. p. 54. L. pyrenaicum Gou. ill. t. 22. f. 1. 2. Apargia Alpina Wild. — All. ped. t. 14. f. 4. (v. v.)
3. L. MONTANUM (Lam. fl. fr. 3. p. 640.) foliis runcinato-dentatis glabris, scapis unifloris nudis supernè incrassatis hirtis, involucris villosis. 2/ in lapidosis Alpium Delph., et Pyrenæorum ex Lapeyr. — Fl. fr. 4. p. 54. Hedypnois taraxaci Vill. dauph. 3. t. 26. — All. ped. t. 1. t. 31. f. 1. (v. v.)
4. L. HASTILE (L. sp. 1123.) foliis runcinato-pinnatifidis glaberrimis, laciniis lanceolatis basi dilatatis subdentatis axi inclinatis, scapo 1-floro nudo glabro,

involuti squamis interioribus glabris. ♂ in pascuis humidis Galliæ occidentalis, mediae, orientalisque. — Fl. fr. 4. p. 55. L. danubiale Jacq. aust. t. 164. — All. ped. t. 70. f. 3. Vill. dauph. 3. t. 24. (v. v.)

B. arenarium, foliis linear-lanceolatis indivisis subdentatis. — In sabuletis maritimis agri Syrtici propè Teste de Buch reperiit cl. L. Dufour. (v. s.)

5. L. HISPIDUM (L. sp. 1124.) radice præmorsâ, foliis pinnatifido-oblongis laciniiis nervo medio perpendicularibus hispidis pilis bifurcatis, scapo unifloro subglabro, involuti squamis lanceolatis acutis subhirsutis. ♂ in lapidosis apricis. — Fl. fr. 4. p. 55. excl. var. β et γ . 5. p. 453. (v. v.)

6. L. CRISPUM (Vill. dauph. 3. p. 84. t. 25.) radice simplici verticali, foliis runcinato-pinnatifidis laciniiis linear-lanceolatis nervo medio inclinatis hispidis pilis apice ramosis, scapo 1-floro hirto, involuti squamis lanceolatis acutis basi sublanatis. ♂ in siccis Delph., Occitanie, Pyren. ex Lapeyr., Bellovacis ex cl. Graves. — Fl. fr. 5. p. 454. (v. v.)

7. L. VILLARSII (Lois. gall. 514.) radice subsimplici verticali, foliis pinnatifidis laciniiis linear-lanceolatis nervo medio perpendicularibus hispidis, pilis simplicibus, scapo 1-floro, involuti squamis hispidulis glabrisve, interioribus lanceolatis acuminatis. ♂ in siccis apricis Delph. infer., Galloprov., Occitanie, agri Ruscinonensis. — Fl. fr. 5. p. 454. L. hirtum Vill. dauph. 3. p. 82. t. 25. (v. v.)

8. L. AUTUMNALE (L. sp. 1123.) foliis lanceolatis pinnatifidis glabris, scapis ramosis declinatis squamosis, pedunculis sub involucro tumescientibus, involuti squamis puberulis lanceolatis acuminatis. ♂ ad margines agrorum et viarum. — Fl. fr. 4. p. 53. — Fuchs. hist. 320. ic. (v. v.)

B. simplex, caule 1-floro. — eng. bot. t. 830. (v. v.)

LXXXVIII. PODOSPERMUM DC. fl. fr. 4. p. 61. — Scorzonerae sp. L.

Involucrum imbricatum squamis margine membranaceis; semina pedicellata pedicello cavo incrassato; receptaculum seminibus delapsis tuberculato-muricatum; pappus sessilis plumosus.

1. P. CALCITRAPÆFOLIUM (DC. fl. fr. 5. p. 455.) caule basi ramoso, foliis petiolatis pinnatifidis, laciniiis lanceolatis acutis, terminali longiore lanceolatâ, superioribus simplicibus, seminibus angulatis glaberrimis. ♂ in provinciis australibus et circâ Parisios. — P. resedifolium Fl. fr. 4. p. 61. non L. — Barr. ic. 800. (v. v.)

2. P. LACINIATUM (DC. fl. fr. 4. p. 62.) caule ramoso erecto, foliis petiolatis pinnatifidis laciniiis linearibus acuminatis, terminali longissimâ linear-lanceolatâ, superioribus linearibus, seminibus subangulatis glaberrimis. (2) ad marginem agrorum. — Scorzonera laciniata L. Gærtn. fr. 2. t. 159. f. 1. S. petiolaris Lapeyr. abr. supp. 120. (v. v.)

3. P? SUBULATUM (DC. fl. fr. 4. p. 61.) caule subramoso infrâ folioso supernè nudo, foliis rigidis linearibus carinato-subulatis. ♂ Sorricinii. — An Scorzonera pinifoliæ Gou. ill. 53. var? (v. s. in specim. imperfecto.)

LXXXIX. SCORZONERA DC. fl. fr. 4. p. 59. — Scorzonerae sp. L.

Involucrum imbricatum squamis margine membranaceis; receptaculum nudum; semina sessilia; pappus substipitatus plumosus.

1. S. HIRSUTA (L. mant. 278.) caule 1-floro, foliis linearibus subhirsutis obtusis, involuti squamis lanceolatis acuminatis glabris, seminibus lanatis. ♂ in lapidosis sterilibus Occitanie, Galloprovinciæ circâ Massiliam et montem Victoriæ, Rupellam. — Fl. fr. 4. p. 60. — Hieracium capillaceum All. ped. t. 31. f. 3. (v. v. DC.)

2. S. ANGUSTIFOLIA (L. sp. 1113.) caule subnudo unifloro apice tomentoso, foliis sublinearibus basi lanatis, involuti squamis subglabris subobtusis, exterioribus lanceolato-ovatis, interioribus linear-oblongis. ♂ in Galliæ mediâ, australi occidentalique. — Fl. fr. 4. p. 60. Gm. sib. 2. p. 2. t. 1. (v. v.)