

*Centaurea pratensis* Thuill. f. *subacaulis* Nob. — V. B. : De Campo à Robiei, 1400-1800 m.

*Centaurea transalpina* Schl. — V. B. : De Caverigno à Fontana ; S. Carlo. — V. Pecc. : De Veglia à S. Carlo.

*Centaurea nervosa* Willd. — Val Calneggia (Nat.) ; de la Corte grande al Piano dei Cresti, v. Ant., 2100-2200 m. ; Campo, calc. c. 1400 m. ; gorge entre Campo et Robiei, calc. 1450-1750 m. ; crête entre Robiei et le Lago bianco, calc. 2000-2100 m. ; entre le Lago bianco et le glacier de Cavagnoli, 2100-2250 m. ; A. Piazza sur Campo, c. 1600 m. ; A. Sevinera à la Corte grande, c. 1800 m. ; Croso sur S. Carlo, 1500-1700 m.

*Centaurea Scabiosa* L. var. *vulgaris* K. — S. Carlo, v. Bavona.

*Centaurea Scabiosa* L. var. *calcarea* Briq.(?) — Un seul exempl., Campo, v. Bavona, c. 1400 m.

*Centaurea Scabiosa* L. var. *tenuifolia* Schl. — Foroglio, v. Bavona (hb. Loc.).

*Lampsana communis* L. — V. B. : De Caverigno à Fontana. — V. Pecc. : Peccia, alluvions ; Veglia, champs.

*Leontodon autumnalis* L. — V. B. : De Sabbione à Fontanellate ; S. Carlo ; Campo, c. 1400 m. ; A. Robiei, c. 1890 m. — V. Pecc. : Bois près Veglia.

*Leontodon pyrenaicus* Gouan. — V. B. : Halbihorenpass, verst. E. et N., c. 2650 m. et crête entre ce col et le Piz. della Medola, 2700-2750 m. ; A. Robiei vers Arzo, 1950-2150 m. ; col de Grandinagia, c. 2600 m. — V. Pecc. : Ponc. del Pulpito, 2550-2615 m. ; la Corona, à l'A. Bolla, c. 2500 m. ; crête entre l'A. Bolla et le Naret, 2450-2600 m.

*Leontodon hispidus* L. — V. B. : S. Carlo ; A. Sevinera sur S. Carlo. — V. Pecc. : Bois près Veglia.

*Leontodon hispidus* var. *alpicola* Chen., v. nov. *Peduncules* monocéphales hauts de 8-15 cm. peu ou pas renflés au sommet, nus ou munis d'une, rarement de deux bractéoles. *Capitules* de même grandeur que dans le type ; folioles involucrales linéaires-lancéolées, appliquées. *Akènes* d'un brun fauve très clair, rugueux, à aigrettes rousses égalant ceux-ci. *Feuilles* atténuées insensiblement en un pétiole très court, sinuées, dentées ou pinnatifides.

Cette variété se présente, comme le type, sous les formes glabrescente, hispidule ou très hispide et chargée de poils trifurqués. C'est la plante de la haute Alpe qui se trouve abondamment et très constante dans les gazons rocaillieux et sur les rochers élevés du Valais, des Alpes vaudoises et de la Haute-Savoie. Sur l'arête de l'Arpille, au col du Sanetsch, où elle foisonne, on trouve réunies toutes ses formes. Au Tessin, elle se rencontre aussi au Ghiridone et au val Piora.

Dans les herbiers que j'ai consultés, elle est classée sous le nom de var. *opimus* K. et mêlée à des exemplaires de celui-ci. Or, la var. *opimus* K. est, comme son nom l'indique, de beaucoup plus grande taille (le double); elle est plus robuste, à gros capitules et à pédoncules fortement renflés au sommet. Cette plante croît dans les terrains riches; elle est peu fréquente. Koch Syn. ann. 1845 la donne comme exclusivement alpine. Des auteurs plus modernes (Cf. J. Briquet, Nouv. Notes flor. Alp. Lem.) tiennent cette indication pour erronée. En effet, on la rencontre aussi à de basses altitudes; ainsi, au Tessin, au-dessus de Gordala, à c. 260 m.

La var. *alpicola*, que je propose ici, est de bien plus petites dimensions; bien moins robuste, elle végète sur un sol maigre et pierreux; *c'est de beaucoup la forme haute-alpine la plus fréquente*. Il est illogique de la réunir à la var. *opimus* K. qui n'est guère qu'une forma maxima. P. Chen. — V. B. : De Fiorera alta au col d'Halbihoren, calc. 2500-2650 m.

*Leontodon hispidus* L. var. *hyoserioides* Welw. — V. B. : S. Carlo; gorge entre Campo et Robiei, calc. 1450-1750 m.

*Leontodon hispidus* L. var. *pseudocrispus* Schultz bip. — A. Robiei, c. 1700 m.

*Picris hieracioides* L. — V. B. : De Caveragno à Fontana; Crosio sur S. Carlo, 1100-1400 m. — V. Pecc. : Peccia, alluvions.

*Picris hieracioides* L. var. *subalpina* Arv. Touv. et Chen. Plante bien moins hérissée sur toutes ses parties et moins rude que le type. *Péricline* ovoïde à écailles toutes apprimées ou les extérieures étalées. *Ligules* uniformément d'un beau jaune d'or, non pourprées en dehors. *Pédoncules* non renflés sous le péricline qui n'est pas étranglé vers son milieu. *Akènes...* ? (Arvet Touvet in sched). — S. Carlo, v. Bavona.