

*hispida* Smith Engl. Bot. 554. Foliis plus vel minus pinnatifidis; indumento et magnitudine multum variat, et in sequentem videtur in montosis transire, folia viva plerumque undulato - crispa. — Auf Triften, Wiesen, Anhöhen, Heiden (A. erectorum Kl. et Richt.). — Mai. Juni. Aug. Sept. 4

\* 1652. *L. hostile* L. foliis subspathulato - lanceolatis elongatis planis deorsum dentatis anthodioque glabriusculis. Jcq. austr. 164. *Picris danubialis* All. ped. t. 70. f. 1. *L. danubiale* Jacq. Praecedente glabrior et gracilior, scapo in primis superne non tam incrassato, foliis plerumque planis, plus vel minus sinuato - dentatis. — Auf Triften, Wald- und Bergwiesen. — Mai. Jun. Aug. Sept. 4

1653. *L. incannus* Scop. scapo simplici subnudo, anthodio pubescente, foliis lanceolatis acutis subdenticulatis cano - scabris, pilis multifidis. *Hieracium incanum* Linn. — Jacq. a. t. 287. *Aparg. incana* W. Sturm Fl. VII. 27. — An sonnigen Kalkhügeln in Oestreich bei Baden: Sauter, in Baiern bei Muggendorf: Koch, b. Ettrizhausen b. Regensburg: Hpp. Cent. Binder, Kapuzinerberg bei Salzburg: Hpp. Tyrol, Oberitalien. — April. 4

1654. *L. Berinii* (Apg.) Bartl. cano - scaber, caulis subramosis basi foliosis, foliis cuneato - lanceolatis sinuato - subdentatis. Rchb. pl. crit. VIII. A. arenaria Moretti. Achenia scabra. — Bei Togliano, Monfalcone, im Friaul: Berini (e manu)

CCCXXIX. *Picris*. L. *Bitterkraut*. Anthod. e squamis planis aequalibus, basi minus accessorium patens. Rec. alveolis lacinulatis. Achenia incurva, fusiformia, reticulato - sulcata, pappo plumoso, sessili.

1658. *P. hieracioides* L. foliis lanceolatis sinuato - dentatis amplexicaulis hispidis, capitulis ramoso - corymbosis, anthodio viridi - canescente. Engl. Bot. 196. Gärtn. 2. t. 159. f. 2. Schk. 216. Fl. dan. 1522. Pedalis et ultra, magis vel minus hispida. — An Wiesenrändern, Feldrainen, in Wäldern. — Jul. Aug. ♂

\* 1659. *P. ruderale* Schm. foliis lanceolatis ciliato - dentatis, pedunculis anthodiisque hispidis. *P. paleacea* Vest. Videtur secundum specimina bohemica et styriaca, forma praecedentis hispidior, humilior, etiam culta et viva non aliter distinguitur, foliorum enim dentura variabilis est

Bartl. am Sande des Isonzo: Moretti. — Jun. Jul. 4

1655. *L. autumnalis* L. scapo ramoso, pedunculis squamosis, anthodio elongato canescente, foliis lanceolatis pinnatifidis glabriusculis. *Hedypnois autumnalis* Smith Engl. Bot. 830. Ap. autumn. W. Schk. t. 220. Variat insigniter forma foliorum, a linearibus subintegerrimis dentatis ad linearis pectinato - pinnatifidas et interrupte laciniatas, ab anthodio glabro ad incanum, caule corymboso et submonocephalo: *Aparg. Taraxaci Horn* Fl. dan. t. 1523. — Auf Triften, Feldrainen, Hügeln. — Aug. Sept. 4

1656. *L. pratensis* (Apg.) Lk. scapo ramoso, foliis lanceolatis sinuato - dentatis pinnatifidisque glabris, anthodio fusco - villoso. Hier. Taraxaci Tim. Praecedente robustior et pariter varians forma foliorum; sed vix varietatem dices quum hoc anthodii indumentum villosum sit insigne. E sem. auct. colui et sponte neam legi. — Auf den Strandwiesen bei Warnemünde und bei Malchin in Meklenburg, bei Dresden an der Weisseritz vor dem Dorfe Plauen. — Aug. Sept. 4

† 1657. *L. Brumati* (Apg.) Schiede: scapo unifloro, anthodio basi laxo. — Um Triest nach Schiede. —

Obs. *Apargia hyoseroides* Vest. B. Z. 1820. 7. seu *Hyoseris taraxacoides* Wulf. in Belgia lecta, quid sit, vix divinabis.

*P. hierac. angustifolia* Wallr. — Auf Felsen bei Prag: Prsl. in Steyermark: v. Vest, — Jul. Aug. ♂ atque fallax. — An Felsen bei Prag: Prsl. in Steyermark: v. Vest, — Jul. Aug. ♂

1660. *P. umbellata* N. v. E. foliis amplexicaulis lanceolatis obtusis repando - denticulatis hirtis, capitulis umbellato - cymosis, anthodio atro - virente. *Leontod. umbellatus* Schrk. *Apargia rigens* Mart. ined. *P. hierac. angustifolia* Wallr. — Auf Berg- und Voralpenwiesen, an steinigen Orten im Gebüsch: am Graseck im Aufsteigen nach dem Wettersteine in Baiern: v. Martens, in Thüringen: Wallr. daselbst in der Gegend von Cölleda an Kalkbergen: Rchb. — Jul. Aug. ♂

1605. adde: Sv. Bot. t. 470.
1606. adde: bei Allendorf am Harze: *Hamp e.*
1627. lin. 6. ante L. adde: var.
1635. pro ♂ lege 4.
1636. adde: Sv. Bot. t. 56.
- 1636 b. C. pumilum *Jacq.* caule hispido subramoso, foliis obovato-oblongis dentatis, capitulis sessilibus. *Jacq.* obs. t. 80. Humillimum asperum, non raro simplex: C. minimum *Prt schl g.* En. t. 12. f. II. flores axillares solitarii aut plures, coerulei. — Dalmatien auf der Insel Lesina: *Prt schl g.* — Jun. Jul. ♂
1640. deleatur: *Picris hirta All.*
1643. substituas nomen: L. *Pollinii Welwitsch*; syn. Ap. *media Host.* — dele locum et repone: am M. Baldo auf den höchsten Triften von der Valle Losanna aus nach Coval Santo: *Pollini*, in den Carpathen an der Seite der Lomnitzer Spitze (Ap. *crocea IV.* Ap. *hirta Geners. A. Taraxaci Whlnb.*): Lang.
1644. substituas nomen: L. *croceus Hnk.* (huc Ap. *crocea Spr.* non *IV.*) et omnino A. *aurantiaca Kit.* herbar. teste cl. *Welwitsch.* Auf den Alpen in Obersteyerman am hohen Zinken bei Seckau: Hänk. *Welw.* — Rectius sicut nomen erit huic speciei: L. *croceus Hnk.*
1645. adde: Salzburg auf dem Kammerlinghorn ober Falleck, auf dem Hirschbühel zwischen Lofer u. Berchtesgaden: v. Spitzel.
1647. lege: *asper.*
1649. adde: Ap. *saxatilis Ten.* in iconе habet folia latiuscula, latiora quidem ac in speciminibus datis, fere A. *hispidae.*
- 1650 b. L. *caucasicus* (Aparg.) M. B. scapo glabro nudo monocephalo, anthodio hirsuto, foliis runcinato-dentatis substrigosis. Rchb. pl. crit. XI. ic. ... Robustior ac sequens, flos magnus speciosissimus, planta anthodii jam solo indumento hirsutissimo insignis." *Welw.* — Im südl. Kärnthen am Loibl (1828): *Welwitsch*, Kirschbaumeralpe bei Linz in Tyrol: v. Spitzel. — Aug. Sept. 24
1651. lin. 5. post transire adde: Ap. *ericetorum Kl.* und Richt. Leipz. Fl.
1652. adde: Locis quibusdam ut in Flora Lipsiensis regione Grimmensi et Colditzensi, in ericetis cum Thecio alpino, cum praecedenti satis

- distincta legitur nec vicissim transiens. Richt.
1652. lege: *hastilis*. — Huc interea referendus β. *nitidus* (Ap. *lucida* [non *Ten.*]: *IV* Welw. in litt.) foliis latoribus lucidis, serraturis triangularibus subaequalibus retrorsis, quae variat foliis scapoque hispidulis. In vulgari L. *hastili* folia plus vel minus angustiora, dentes extrorsi et superiores antrorsi nec retrorsi ut illius, cujus habitus fere ut in Ap. *eichoriacea Ten.* t. 71. sed haec radice grumosa insignis est. — In Kärnthen auf dem Loibl: *Welwitsch*. — Sept. 24
- 1652 b. L. *tenuiflorus* (Aparg.) Gaud. scapo monocephalo brevissime pubescente, foliis lanceolato-linearibus subsinuato-denticulatis furcato-pubescentibus, achenis subdenis attenuatis exasperatis. Specmini meo: folia 3—4 pollicaria vix ultra 4. lin. lata, pili bi-tri-furcati, scapus dodrantalis, superne squamis quibusdam remotis longe acuminatis glabris, capitulum minus ac affinum, tenuius. (Similis planta sed glaberrima, ulterius observanda legitur: auf Waldwiesen bei Contobello: Heynhold.) — Südschweiz, im Mailändischen auf dem M. Salvadore bei Lugano (1829): Em. Thomas. — Juni. 24
- 1652 c. L. *hyoseroides* *Welw.* glaberrima, scapo nudo monocephalo, flosculis anthodio duplo longioribus, foliis pectinato-pinnatifidis, lacinis lanceolato-linearibus acutis. Rchb. pl. crit. XI. ic. ... Gracilis, lucens, valde Ap. *lucidae Ten.* Neap. t. 70. accedens, nisi ipsa, nostrae tamen laciniae vix ad basin unidentatae. Quasi L. *hastilis* formam extremam, quoad foliorum dilacerationem diceres, nisi anthodium dimidio tenuius gracilis esset et flosculi definite longiores, flos igitur fere *Hyoseridis*, quam similitudinem uterque sagacissimorum inventorum fere simul mihi benevole indicavit. Variat hispidula. — An Felsen der Voralpen in Steyermark bei Lessingfall und in Kärnthen bei Maria-Rain: *Welwitsch*, auf einem Feldabsatz von Mergelschiefer am Fusse der Dornbieneralpen bei Bregenz und in Tyrol auf Kalkboden bei Zierl (Ap. *hyoseridiflora*): Saut. — Juli. Aug. 24
1654. lin. 5. pro VIII. lege: IX. ic. 1120.