

omnium dimensionibus minoribus, pubescentia densiore, segmentorum folii forma aliena, phyllis involucri longiore mucronatis recedit.

**2. Leontodon jailae Klok. species nova.**

Rhizoma abbreviatum, brunneum, crassum. Tota planta laete viridis. Caules scapiformes 1—4, assurgentis, ca. 10—25 cm alti, simplices calathidio apicali unico, pilis rigidis inaequalibus apice 2—4-fidis, saepissime bifidis, densiuscule obtecti, foliis omnino destituti. Folia radicalia rosulanta, dentata vel pinnatim incisa, ambitu oblongo-ovata vel saepius oblanceolata, ca. 3—12 cm longa, 0,5—2 cm lata, basin versus in petiolum obsoletum attenuata, apice obtusa (externa in rosula) vel acutata, pilis 2—3-fidis, subtus densioribus et longioribus (usque ad 1,2 mm longis) obtecta; dentes vel lobi foliorum saepissime deflexi. Calathidia floribus cum ca. 17—24 mm longa; involucrum 11—14 mm longum; phylla ei linear-lanceolata, atriuscule virentia, dorso pilis apice bifidis inaequalibus simplicibus subundulatis 1—2,5 mm longis immixtis pubescentia; flosculi involucro 1,5-plo longiores, ligulae eorum flavae denticulis apice brunnei-cinnamomei. Achenia fusiformia ca. 6 mm longa, 0,8—0,9 mm diametro, cinnamomea, longitudinaliter striatella, transversim rugulosa, apice scabrida; pappus ca. 8 mm longus, albidus.

Floret VII. Habitat in declivibus calcareis montanis tauricis.

Type s. RSS Ucr., ditio Taurica, districtus Alushtensis, mons Roman-Kosh, 16. VII 1955, A. I. Gisenko.

Affinitas. A proximo *L. biscutellifolio* DC. foliis minus dense pilis 2—3-, non 3—4-fidis, mollioribus, phyllis involucri pilis solum bifidis simplicibus immixtis, nunquam 2—5-fidis, obtectis, ligulis flosculorum flavis, extus haud rubescensibus, acheniis brevioribus et crassioribus erostratis, pappo breviore valde abhorret.

**3. Generis *Tragopogon* L. series Pseudorientales Klok. nova. — *Tragopogon orientalis* auct., non L.**

Calathidia haud numerosa, interdum singularia. Pedunculi sub calathidio saepissime paulum incrassati, involucrum octophyllum vel interdum decaphyllum, 2—4,5 cm longum; flosculi flavi necnon aurantiaci, marginales involucro sublongiores vel manifeste longiores. Antherarum tubulus saepissime nigricans. Achenia rosto elongato. Herbae biennes glabrae vel glabriusculeae.

Type seriei: *Tragopogon melanatherus* Klok. Ad seriem hanc species praticolae eurasiatricae adhuc indescriptae et cum *T. orientalis* L. confusae pertinent.

*T. orientalis* L. ex diagnose autentico «differt a *T. pratensi* Flore magiore, Calyce, ubi reflectitur quasi fracto; Radio Corollae subtus luteo, nec fuso striato; Antheris luteis, nec fuscis»; secus Willdenovium species haec «habitat in Oriente, Astracan». *T. pratensis* L. septentrionali-europaeum a nostris achenio brevius rostrato recedit.

**4. *Tragopogon moldavicus* Klok. species nova. — Series Pseudorientales Klok.**