

furcatis constante canescens, rhizomate indurato nudo cæspitoso, foliis omnibus radicalibus lanceolatis obtusiusculè et irregulariter dentatis crispulis in petiolum attenuatis, scapis simplicibus vel imâ basi divaricatum furcatis supernè squamulis pluribus linear-setaceis obsitis sub capitulo subincrassatis, involuci phyllis ab exterioribus subpatulis ad intima sensim elongatis acutis margine dense et tenuissimè sub lente albo-ciliolatis cæterùm glabris glaucis, ligulis concoloribus corollæ tubo æquilongis, acheniis cylindricis supernè subattenuatis muriculatis pappo eis paulò breviori superatis, setis pappi omnibus a basi plumosis exterioribus paulò brevioribus.

Hab. in Libano suprà Cedros. (Boiss.)

Planta semipedalis, folia 1-2 lineas longa 4-5 lin. lata. A *L. saxatili* distinctum foliis tantum dentatis, indumento magis canescenti, involuci phyllis præter ciliola marginalia brevissimis glabris etc. *L. asperum* differt ciliis phyllorum multò validioribus nec pruinæformibus, pilosque totius plantæ sparsos multò majores habet.

LEONTODON KOTSCHYI Boiss. in Kotsch. pl. Pers. bor. 1846.

L. perenne cæspitosum totum pilis brevissimis stellatis densè obsumum pannosum canescens, foliis omnibus radicalibus angustè lanceolatis in petiolum attenuatis remotè et acutè dentatis, caulis scapiformibus simplicibus vel ramo auctis parcissimè squamulosis sub capitulo incrassatis, involuci phyllis margine et secùs lineam medium brevissimè stellato-puberulis cæterùm glabris omnibus adpressis imbricatis ab infimis brevissimis ad intima lanceolato-linearia sensim auctis, ligulis concoloribus basi pilosis tubo æquilongis, acheniis...

Hab. in monte Demawend alt. 6600'. Kotsch. № 341.

Folia 3-4 poll. longa, 4-5 lin. lata, scapi 7-8 pollicares. Hanc speciem quoad achenia ignotam dubitanter propono; *L. Libanotico* imprimis affinis ab eo differt scapis erectis, phyllis involuci regularius imbricatis elongatis adpressis, foliis remotè dentatis. Ob phylla latiuscula regulariter imbricata *L. asperimum* cæterùm diversissimum refert.

LEONTODON OXYLEPIS Boiss. et Heldr.



L. totum pilis brevissimis stellatim furcatis canescens asperulum, rhizomate indurato ramoso cæspitoso, foliis lanceolatis elongatis in petiolum longum attenuatis remotè et acutè dentatis acutis omnibus