

LEONTODON GRÆCUM Boiss. et Heldr.

L. perenne totum pilis brevissimis apice 3–5 furcatis canescens asperulum, rhizomate indurato basi nudo ramoso cæspitoso, foliis omnibus radicalibus lanceolatis pinnatipartitis vel profundè pinnatifido-sublyratis segmentis triangularibus vel angustè linearì-lanceolatis acutis terminali majori acuto, caulis scapiformibus folia plures superantibus monocephalis rariùs dicephalis præter squamulam linearem nudis sub capitulo demùm clavato-incrassatis, involuci squamis adpressiusculis ab infimis brevioribus ad interiores sensim auctis linearibus acutis ad totam faciem exteriorem pilis minimis ramosis pulverulento-puberulis inferioribus prætereà secùs lineam medium pilis furcatis elongatis obsitis. ligulis subtùs pallidè rubellis involucro sesquilongioribus, acheniis cylindricis supernè attenuatis erostratis tuberculato-scabris pappo albo eis breviori superatis, pappi setis omnibus a basi plumosis exterioribus subbrevioribus.

Hab. in montibus Græciæ, *Lycabetto*, *Pentelico*. (Spruner. Boiss.)

Var. β *alpinum*. — Omnibus partibus minùs, indumentum magis griseum minùs abbreviatum, capitula minora et achenia paulò magis abbreviata.

Hab. in locis excelsioribus Taygeti loco *Choupata* dicto (Heldreich), in *Græcia* loco non notato. (Aucher N° 3334.)

Folia in formâ vulgatori 3–6 pollicaria profundè laciniata. Scapi 6–12 pollicares, capitula magnit. eorum *L. asperi* inter quod et *L. saxatile* medium est. A. *L. saxatili* differt pilis multò brevioribus 4–5 nec trifurcatis, scapis sæpè furcatis, capitulis plerumquè majoribus, involuci phyllis præter setas medianas pulverulento-hirtis nec glabris, ligulis magis elongatis. *L. asperum* habitu affinius distinctissimum est pilis longioribus sparsis, phyllis involuci margine eleganter pilis 5–7 fidis densissimè ciliatis et præter setas nonnullas secùs lineam medium glabris. *L. biscutellæfolium* DC. deniquè pro quo am. Spruner nostram plantam habuerat in herb. DC. observatum longè differt squamis involuci longè acuminatis subrecurvis, achenio in rostrum manifestè attenuato, et (saltem planta Italica typus speciei) probabiliter ad *L. saxatilis* formas spectat.

LEONTODON LIBANOTICUM Boiss.

L. totum indumento denso adpresso pilis brevibus densis apice 3–4

furcatis constante canescens, rhizomate indurato nudo cæspitoso, foliis omnibus radicalibus lanceolatis obtusiusculè et irregulariter dentatis crispulis in petiolum attenuatis, scapis simplicibus vel imâ basi divaricatim furcatis supernè squamulis pluribus linear-setaceis obsitis sub capitulo subincrassatis, involuci phyllis ab exterioribus subpatulis ad intima sensim elongatis acutis margine dense et tenuissimè sub lente albo-ciliolatis cæterùm glabris glaucis, ligulis concoloribus corollæ tubo æquilongis, acheniis cylindricis supernè subattenuatis muriculatis pappo eis paulò breviori superatis, setis pappi omnibus a basi plumosis exterioribus paulò brevioribus.

Hab. in *Libano* suprà Cedros. (Boiss.)

Planta semipedalis, folia 1-2 lineas longa 4-5 lin. lata. A *L. saxatili* distinctum foliis tantum dentatis, indumento magis canescenti, involuci phyllis præter ciliola marginalia brevissimis glabris etc. *L. asperum* differt ciliis phyllorum multò validioribus nec pruinæformibus, pilosque totius plantæ sparsos multò majores habet.

LEONTODON KOTSCHYI Boiss. in Kotsch. pl. Pers. bor. 1846.

L. perenne cæspitosum totum pilis brevissimis stellatis densè obsumum pannosum canescens, foliis omnibus radicalibus angustè lanceolatis in petiolum attenuatis remotè et acutè dentatis, caulis scapiformibus simplicibus vel ramo auctis parcissimè squamulosis sub capitulo incrassatis, involuci phyllis margine et secùs lineam medium brevissimè stellato-puberulis cæterùm glabris omnibus adpressis imbricatis ab infimis brevissimis ad intima lanceolato-linearia sensim auctis, ligulis concoloribus basi pilosis tubo æquilongis, acheniis...

Hab. in monte *Demawend* alt. 6600'. Kotsch. № 341.

Folia 3-4 poll. longa, 4-5 lin. lata, scapi 7-8 pollicares. Hanc speciem quoad achenia ignotam dubitanter propono; *L. Libanotico* imprimis affinis ab eo differt scapis erectis, phyllis involuci regularius imbricatis elongatis adpressis, foliis remotè dentatis. Ob phylla latiuscula regulariter imbricata *L. asperum* cæterùm diversissimum refert.

LEONTODON OXYLEPIS Boiss. et Heldr.



L. totum pilis brevissimis stellatim furcatis canescens asperulum, rhizomate indurato ramoso cæspitoso, foliis lanceolatis elongatis in petiolum longum attenuatis remotè et acutè dentatis acutis omnibus