

288. *Leontodon (Oporinia) Linkii Wallr.*, radice praemorsa prolixo fibrillosa, scapo 2 — 4-cephalo, foliis e basi tenuata lanceolatis subintegris sinuatove dentatis, pedunculis sensim incrassatis bracteolatis phyllisque calycinis dorso setuloso-pilosus, achaeniis striatis transversim labellato-rugosis exaratis biformibus, externis linearibus utrinque aequalibus columnaribus, internis in apicem tenuatum sensim productis. — *Leontodon pratensis* Link., Dethard. nec auctor.)

Auf salzhaltigen Wiesengründen hier und da. — Mit Vergnügen trage ich hier zur Sicherung einer Gewächsart bei, deren Bekanntschaft dem Scharfblicke unseres hochgefeierten *Link* längst angehörte, neuerlich aber fast durchgängig verkannt, und mit den, durch die Behaarung des Kelches verähnlichten, auf den Kartoffelfeldern des Oberharzes allgemein verbreiteten Formen des *L. autumnalis* als dessen var. *pratensis* gemissbraucht und verwechselt worden ist.

289. *Thrincia leontodontoides* Wallr., radice subsimplici fusiformi, foliis radicatis lanceolatis remote-sinuato-dentatis glabris, capitulis ovato-subrotundis foliolis e basi latiore tenuatis glabris duodenis calyculatis, achaeniorum radialium in apicem attenuatorum punctatorum pappo multifido, discoidis linearibus multistriatis muricatis sensim in apicem productum attenuatis ejusque pappi biserialis radiis e basi lanceolato scariosa achaeniorum apice latioribus anthodium superantibus.

Auf umgehackten Grasplätzen zwischen Bauernpflanzungen des südlichen Harzes, an einem Orte. — Ueber meine No. II04 untergeschobene *Thr. Leysseri* vergleiche man DC. prodr. VII. 100 und unterscheide sie von *Thr. hirta* DC. nec Roth, wie ich in den Schedul. cr. längst angezeigt habe.