

- tis pinnatipartitis lobis subacutis ferè triangularibus pilis rigidis simplicibus hirtis, scapo foliis multò longiore glabro, invol. squamis acuminatis glabris ant secùs lineam dorsalem parcè setosis, achæniis læviusculis. \mathcal{L} in saxosis lapidosisque apricis Galliæ australis ab agro Ruscinonensi ad Delphinatum, in Pedemontio et agro Forojuliensi (Reichenb.) DC. fl. fr. suppl. p. 454. L. hirtum Vill. dauph. 3. p. 82. t. 25. Picris hirta All. ped. n. 765. Apargia Villarsii Willd. sp. 3. p. 422. L. hispidum β . fl. fr. n. 2972. (v. v. et s.)
15. L. ROSANI, foliis radicalibus lineari-oblongis dentato-pinnatifidis obtusis pilis paucis rigidulis simplicibus hirtellis, scapo glabriusculo sub anthodio puberulo folia multò superantibus, invol. parcè hispidi squamis exter. lanceolato-linearibus adpressis, achæniis muricatis. \mathcal{L} in collibus regni Neapolitani circà Rosano, Ischià, Aprutio, etc. Apargia Rosani Ten.! fl. neap. app. 5. p. 26. syll. 394. Guss.! in litt. An var. L. Villarsii? In specim. quinque à cl. Ten. et Guss. missis pilos simplices nec glochidiatos video. (v. s.)
16. L. LUCIDUM, glaberrimum, foliis radicalibus oblongo-cuneatis obtusis basi attenuatis obtusè pinnatifidis lobo terminali ovato majore, scapo foliis multò longiore striato sub capitulo parcè bracteolato, invol. squamis lanceolatis margine subscariosis, achæniis muricatis. \mathcal{L} in sylvulis circà Sarzanam mense julio florentem legi, et lectam in collibus Enganeis à cl. Schouw recepi. Videtur eadem ac Apargia lucida Ten. cat. h. neap. app. 1819. p. 71. in Samnio et ad Monte-Miletto lecta, sed in ejus prodr. omissa et ideò incerta. Dens-leonis, etc. Bonan. ed. Cup. t. 92? Affinis L. Caucasico et dabio sed achænia evidenter et densè muricata. (v. v. et s.)
17. L. CAUCASICUM (Fisch. cat. h. gor. 1812. p. 34 non Stev.), foliis radicalibus runcinato-dentatis basi in petiolum attenuatis pilis simplicibus paucissimis subciliatis, scapo glabro foliis multò longiore, invol. squamis extimis subulatis, cæteris lanceolato-linearibus acuminatis parcè subpilosus, achæniis striatis non muricatis. \mathcal{L} in subalpinis graminosis Caucasi ad montem Kaischaur (Bieb) et Kasbeck (Mey.!) Apargia Caucasica Bieb. fl. et suppl. n. 1598. (v. s.)
18. L. DUBIUM (Reichenb. fl. exc. 1. p. 252), foliis obovato-lanceolatis dentatis pilosiusculis, pilis paucis apice furcatis, scapo 1-cephalo glabriusculo ebracteato, invol. squamis pilis simplicibus hirtellis; achænio breviter rostrato lævi. \mathcal{L} in pratis petrosis et arenosis subalpinis Germaniæ (Hopp.), Helvetiæ (Schleich!). Apargia dubia Hopp.! in Sturm deutschl. fl. cum icon. Species verè mihi dubia sub 3 formis ex specim. authenticis apparet.
- α . foliis dentatis pilosiusculis. — icon Sturmii citata. (v. s.)
- β . foliis runcinato-pinnatifidis pilosiusculis. — (v. s.)
- γ . foliis runcinato-pinnatifidis glabris. — icon. cit. f. 6. (v. s.)
- † *Species non satis notæ.*
19. L. ANNUM (Vis. ill. pl. p. 38. f. 2. sub Apargia), radice exili, foliis radicalibus basi attenuatis latè linearibus runcinato-pinnatifidis rariùs integris pilis simplicibus suprà et margine hispidis, scapo basi hirsuto foliis longiore supernè glabro subincrassato squamuloso, invol. hispido. \textcircled{L} in Ægypto. Leontodon asperum Forsk. fl. æg.-ar. 145?
20. L. SUBLXRATUM (Merat ann. sc. nat. 22. p. 108), foliis lanceolatis basi sinuato-runcinatis, scapo erecto rigido scabro glabro, invol. ferè glabro. — in Galloprovinciâ. †.
21. L. TARAXACOIDES (Mer. ann. sc. nat. 22. p. 108), foliis runcinatis pilis brevibus stellatis scabris, scapo glabro suberecto. — in humidis Galliæ et Hispaniæ. Herba 3-4-pollic. †.
22. L.? HYOSEROIDES, foliis runcinatis hirtis, pilis simplicibus furcatisque, scapo 1-cephalo filiformi glabro, invol. 8-phyllo glabriusculo, achæniis omnibus erostribus pappo plumoso coronatis. — in Belgio. Apargia hyoseroides Vest in florâ 1820. p. 7 non Seb. Hyoseris taraxacoides Wulfen. An Thrinciæ hirtæ? var.? ex ipso auctore. †.