

longa, brunnea, albescens vel badia. *Cypselae* 3-3.5 mm longae, pappu 2-3 mm longo, albo.

Hab. in Lusitaniae medio-orientalis soli cessatione, fruticetis et silvarum caducifoliarum rarioribus.

Typus: Marvão, 500 m antes de entrar nas muralhas da vila, nas margens dum souto, alt. ca. 750 m, exp. E, 23 Jun. 1973, M. Pinheiro de Mello (LISI).

In honorem cl. lusitanici botanici Antonii Xavieris Pereira Coutinho hanc speciem grato animo dicamus.

P. 478 — **Centaurea melanosticta** (Lange) Franco, comb. & stat. nov.

C. limbata Hoffmanns. & Link [var.] *β. melanosticta* Lange, *Vid. Medd. Naturhist. For. Kjöbenhavn* 1861: 86 (1861).

C. micrantha Hoffmanns. & Link ssp. *melanosticta* (Lange) Dostál, *Bot. Jour. Linn. Soc.* 71: 199 (1976).

P. 479 — **Centaurea herminii** Rouy (b) ssp. *lusitana* (J. Arènes) Franco, comb. & stat. nov.

C. paniculata L. ssp. *caerulescens* (Rouy) Briq. & Cavillier var. *lusitana* J. Arènes, *Agron. Lusit.* 11(1): 22 (1949).

P. 501 — **Leontodon pyrenaicus** Gouan (d) ssp. *herminicus* Franco, ssp. nov.

A typo speciei differt scapis 16-30 cm altis, foliis 60-130 × 15-25 mm, lyrato-pinnatipartitis segmentis vulgo patulis, petiolo 25-75 mm longo, tenuis; involucro 10-13 mm longo.

Incolit Lusitania Herminii graminosa montosa, alt. 1500-1900 m.

Typus: Serra da Estrella, prox. à Lagoa Escura, Jul. 1880, M. Ferreira (COI).

P. 527 — **Taraxacum pseudolandmarkii** Franco & Rocha Afonso, sp. nov.

Hemicryptophyton rosulatum aliquantum *T. landmarkii* exspectans. Folia 7-16 cm longa, lanceolata, pinnatipartita segmentis 3-5 jugis, triangulari-acutis, pa-