

Р. ЭСКЭРОВА

*Leontodon* L. ЧИНСИНИН АЗЭРБАЙҶАНДА ЈЕНИ НӨВҮ

(АзэрбайҶан ССР ЕА академики В. Р. Волобујев тэрэфиндэн тэгдим едилмишдир)

*Leontodon talyschensis* Asker sp. nova—*L. asperum*  $\beta$  *Huetii* Boiss., Fl. or., III, 730 (1875), p. p.—*L. Kotschyi*, Липский, Фл. Кавказа, 368 (1899); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 228 (1934); Опр. раст. Кавк. 504 (1949); p. p. non Boiss.

Perennis, griseus, pilis breviter stellatis pubescens. Caules 10—20 cm alti, pauci, erecti, simplices, interdum a medio furcato-patentes, cylindracei, sulcati, pilis brevissimis dense pubescentes. Folia conescente viridia, rosularia, lanceolata, emarginato-dentata vel emarginato-spathulata, utrinque subtus pilis apice stellatis densius pubescentia. Involucra oblongo-conica, 15—16 mm longa (in florescentia). Involucry phylla cano-viridia, pilis brevissimis stellatis pubescentia, ad nervum medium marginemque pilis brevibus crassiusculis rigidis apice stellatis tota superficie tecta, phylla exteriora triangulare lanceolata vel lanceolata, breviora, inferiora anguste lanceolata. Flores ligulati flavi, involucro 1—1,5—plo longiores. Achenia 8—10 mm longa, tenuter cylindranei, apice attenuata, sulcata, breviter aspera. Fl: V—VI, fr. VI—VII.

Habitat in decliviis lapidosis siccis prov. Zuvant.

Typus. Zuvant, in viciniis pag. Kosmaljan in monte Burband, in lapidosis, 23/V 1935 A. Grossheim (Herb. Inst. bot. nom. V. L. Komarov Ac. Sc. Azerbaidsh. R S S, Baku).

Affinitas. A *L. Kotschyi* Boiss. differt pedunculis solidis (non cavis), ad calathidiorum basin non incrassatis, phyllis ad nervum medium marginemque pilis crassiusculis rigidis brevibus stellatis pubescentibus, tota superficie pilis brevissimis stellatis densius tectis.

Чохилик, боз, сых, гыса, улдузвари түклэрлэ өртүлү биткидир. Көвдәси 10—20 см һүндүрлүкдәдир, ики ја да бир нечә зоглудур, дурандыр, бәсит, бә'зән ортадан начавары будагланандыр, цилиндрварыдыр, шырымлыдыр, боздур, жарпаглары адәтән розетка әмәлэ кәтирләр, лансетвары, аралы ојуглудишли ја да ојуглу-күрәкварыдыр, бозумтул-јашылдыр, һәр ики тәрәфдән (ашағыдан даһа сых) улдузвари түклүдүр, гајдасына доғру дараландыр. Сәбәти узунсовконусварыдыр. Сарғы чоғ гыса улдузвары түклә өртүлүдүр, орта дамарда вә кәнарларда јерләшән түкләр исә сәрт, галынлашмыш улдузварыдыр, харичдәки сарғы жарпагчылары үчбучағлы-лансетварыдыр, ја да нештәрварыдыр, гысадыр, ичәридәки жарпаглар исә дар лансетварыдыр. Д и л ч и к в а р ы ч и ч ә к л ә р и с а р ы, с а р ғы ж а р п а г ч ы г л а р д а н

1,5 дэфэ узундур, тохумчасы 8—10 мм узунлугда, назик цилиндрвары, тәпәсинә доғру дараландыр, шырымлыдыр, һамар дежилдир. Ч. V—VI, М. VI—VII.

Талышын дашлыг јамачларында битир. Тип. Зуванд, Космалјан кәндинин әтрафында, Бузбанд дағында, дашлыг јерләрдә, 23. V 1935-чи ил, А. Гурвич, Азәрбајчан ССР Елмләр Академијасы В. Л. Комаров адына Нәбатат Институтунун һербарисиндә (Бақы шәһәриндә) сахланыр.

Тәдгиг едилмиш нүсхәләр.

Ләнкәран рајону, Перембел кәндинин әтрафы, 8. VI 1938-чи ил, А. Гроссһейм, Ләнкәран рајону, Говери вә Мондыгја (мәчрасында) чајлары арасында, гајаларда, 23. V 1916-чы ил, А. Гроссһейм, Ләнкәран рајону, Аран кәндинә јахын, кениш, аз маил шәрг јамачларда, 9. VII 1931-чи ил, Е. Матвејева, Ләнкәран рајону, Бузачар кәндинә јахын шимал-шәрг јамачларда, 1700 м һүн., 3. VII 1931-чи ил, Е. Матвејева. Талыш, Дыгја вә Чани кәндләринин арасында, 5500, 14. VI 1894-чү ил, Ломакин.

Ғоһумлуг. *L. Kotschyi* Boiss. нөвүндән ашағыдакы хүсусијјәтләрилә фәргләнир: чичәк охунун бош олмасы вә сәбәтин әсасында јоғунлашмасы илә сарғы јарпағларынын орта дамарында вә кәнарында галын улдузвары түкләрин олмасы вә һәмчинин биткинин үмуми түкләнмәсилә.

#### ӘДӘБИЈАТ

1. Гроссгейм А. А. Флора Кавказа, IV, 1934. 2. Гроссгейм А. А. Определитель растений Кавказа. 1949. 3. Липский В. И. Флора Кавказа (Труды Тифлисского Ботанического сада), вып. IV, 1899. 4. Boissier E. Flora orientalis, III, Geneva et Basiliae, 1875.

Нәбатат Институту

Алынмышдыр 29. VII 1958

Р. Аскерова

### Новый вид рода *Leontodon* L. из Азербайджана

#### РЕЗЮМЕ

При обработке материалов гербария для „Флоры Азербайджана“ нами был найден новый вид рода *Leontodon* L. Это — многолетнее, серое, коротко опушенное звездчатыми волосками растение. Стебли 10—20 см высоты, в числе двух или немногих, прямые, простые, изредка от середины вильчато-разветвленные, цилиндрические, бороздчатые, серые, густо опушенные очень короткими жесткими, на верхушке звездчатыми волосками. Листья серовато-зеленые, в прикорневой розетке, ланцетные, отдаленно выемчато-зубчатые или выемчато-лопастные, с обеих сторон (снизу более густо) опушенные звездчатыми на верхушке волосками, суженные в черешок. Обертки продолговато-конические, очень коротко опушенные звездчатыми волосками, по средней жилке и краю усажены жесткими, толстоватыми, на верхушке звездчатыми волосками, наружные листочки треугольно-ланцетные или ланцетные, более короткие, внутренние — узколанцетные. язычковые цветки желтые, в 1,5 раза длиннее обертки. Семянки длиной 8—10 мм, тонко цилиндрические, кверху суженные, бороздчатые, коротко шероховатые. Цветет в мае—июне, плодоносит в июне—июле.

Растет на каменистых склонах Талыша.

От *L. Kotschyi* Boiss. наш вид отличается прежде всего цветоносами не полыми и не утолщенными у основания корзинок, наличием толстоватых звездчатых волосков по средней жилке и краям листочков обертки, а также более коротким и густым звездчатым опушением всех частей растения.