

## LXVIII. UROSPERMUM Scop. Schwefelsame.

- Hülle weich-flaumig; Frschnabel vom Grunde an allmählich verschmälert. *Kl.*
- Dalechampii** (L.) Desf. Weichhaariger S. Hülle borstig-steifhaarig; Frschnabel plötzlich in einen fadenförmigen Stiel zusammengezogen. *Kl.*
- picroides** (L.) Desf. Bitterkrautartiger S.

## LXIX. LEONTODON L. Löwenzahn.

- 1 { Alle Fr. mit federigem Pappus ..... 2  
 Die randständigen Fr. ohne federigen Pappus, nur mit einem zerschlitzten Krönchen o. mit einigen Schüppchen an Stelle des Pappus ..... 13
- 2 { Strahlen des Pappus alle gleichartig federig; Stg. oft ästig; B. fiederspaltig o. nur gezähnt; Köpfchenstiele oben verdickt; Gr. (wenigstens getrocknet) schwärzlich o. grünlich. *Verbr. u. hfg. autumnalis* L.\*) Herbst-L.  
 Strahlen des Pappus ungleich, die inneren federig, die äußeren kürzer, oft haarförmig und rauh, seltener ebenfalls federig; Gr. gelb ..... 3
- 3 { Hülle von langen schwarzen Haaren zottig-rauhhaarig; B. lanzettlich, in den Bstiel verschmälert, ganzrandig, gezähnt o. fiederspaltig; Schaft oben verdickt, kaum länger als die B. A. (fehlt *Kl.*)  
**taraxaci** (Vill.) Lois. Schwarzhaariger L.  
 Hülle kahl, kurzhaarig o. filzig, manchmal auch mit einzelnen längeren schwarzen Haaren besetzt .... 4
- 4 { Wst. kurz, schief, abgestutzt ..... 5  
 Wst. senkrecht, in eine verlängerte Pfahlwurzel übergehend ..... 9
- 5 { B. kahl o. zerstreut behaart ..... 6  
 B. mehr o. weniger dicht mit gegabelten o. verzweigten Haaren besetzt, oft graufilzig ..... 8
- 6 { Köpfchenstiel mit mehreren Schuppen besetzt; Hüllb. kurz kraushaarig; B. seicht gezähnt o. ganzrandig, kahl o. mit zerstreuten einfachen Haaren; Bt. gelb, seltener orange. A. (fehlt *Kl.*)  
**pyrenaicus** Gouan. Pyrenäischer L.  
 Köpfchenstiel mit 1-2 Schuppen besetzt o. nackt; Hüllb. kahl o. spärlich behaart; Bt. gelb .... 7

\*) L. pratensis Rehb. ist durch schwärzlich-zottige Hüllen ausgezeichnet.

- 7 { B. buchtig-gezähnt, nur ausnahmsweise fiederspaltig.  
*Verbr. u. hfg. . . . danubialis Jacq.* Gemeiner L.  
 B. tief fiederteilig, mit schmalen, oft linealen Abschnitten; Schaft meist niedrig. *A. u. Vora.*  
**hyoseroides Welw.** Schweinssalatblättriger L.
- 8 { B. mehr o. weniger behaart, buchtig gezähnt, nur ausnahmsweise fiederspaltig. *Verbr. u. hfg.*  
**hispidus L.** Kurzhaariger L.  
 B. dicht steifhaarig, fiederteilig, mit wellig-krausen Abschnitten; Schaft meist niedrig. *A. u. Vora.*  
**pseudocrispus Schltz.** Krauser L.
- 9 { B. buchtig-gezähnt\*) o. fiederspaltig . . . . . 10  
 B. ganzrandig o. entfernt klein-gezähnt; Stg., B. u. Hülle von dichter Behaarung grau o. graugrün . . . . . 12
- 10 { Äußere Hüllb. dicht kämmig-gewimpert. *Kr. (?)*  
**asper (W. K.) Rehb.** Rauher L.  
 Äußere Hüllb. am Rande etwas angedrückt flaumig, nicht gewimpert; B. mehr geteilt . . . . . 11
- 11 { B. von dicht stehenden Haaren rauh. *Südt. Kr. Kl.*  
**crispus Vill.** Felsen-L.  
 B. kahl. *Kl. . . . . Visianii Fritsch.* Visiani's L.
- 12 { Schaft immer 1 köpfig; Behaarung kurz-filzig.  
*Verbr. (fehlt Sch. B. Kl.)*  
**incanus (L.) Schrk.** Grauer L.  
 Schaft 1—3 köpfig; Behaarung äußerst kurz, mehlstaubartig; Pfl. kleiner. *K. Kl.*  
**Berinii (Bartl.) Roth.** Bestäubter L.
- 13 { Wzfasern walzlich; die mittleren Fr. an der Spitze in einen Schnabel verschmälert.  
*M. (N.?) St. K. Kr. Kl. (L. Leysseri.)*  
**taraxacoides (Vill.) Mérat.** Hundslattich.  
 Wzfasern rübenförmig verdickt; die mittleren Fr. von der Mitte an in einen Schnabel verschmälert. *Kl.*  
**tuberosus L.** Knolliger L.

Anmerkung. In *B.* wurde *L. autumnalis* × *danubialis*, in *Südt.* *L. crispus* × *incanus* beobachtet. — *L. danubialis*, *hispidus*, *hyoseroides* u. *pseudocrispus* sind durch Zwischenformen verbunden.

\*) In *Südt.* wurde *L. tenuiflorus* (Gaud.) Rehb. gefunden, der sich durch entfernt-buchtig-gezähnte und sparsamer, aber rauher behaarte B. von *L. incanus* unterscheidet.