

480 SYNGENESIE. = POLYG. ÉGALE.

4. LEPICAUNE MULTICAULIS. LaPeyr. *Fl. Pyren.* t. 169. H. *Pyrenaicum*. LIN. *Syst. nat.*

L. caule erecto simplici sulcato glabriusculo ; foliis radicalibus oblongis basi profundè dentatis , caulinis lanceolatis , hastato-sagittatis amplexicaulibus dentatis. WILLD. (Calycis squamæ lineares obtusæ triquetrae patentés recurvæ carinatae , oris et carinâ ciliatis) LAPEYR. WILLD. *sp.* 3. p. 1582. \mathcal{L}

Hieracium Pyrenaicum majus Blattariæ folio hirsutius. TOURNEF. *Topog. et Inst.* 472.

Elle se fait distinguer par la grandeur le nombre et le brillant de ses fleurs couleur d'or , et par ses calices presque blanchis par la quantité de poils qui les recouvrent ; ses semences sont aiguës et cendrées.

Prairies alpines , gazons des sommets. Aux Canals de Lecca , à Madres , au Llaurenti , Sem , Goulié , Olbié , Port de Coumebiere , Pic de Gard , Esquierry , Labatsec , lacs d'Oo , les Cougous , sommet du Port de Pinede.

β . Major , ramosa , latifolia. HERM. *Parad. t.* 184.

Au Llaurenti , Cagire.

γ . Minor simplex uniflora.

Hieracium austriacum. JACQ. *Aust. t.* 441. *Crepis austriaca.* JACQ.

M. d'Esquierry , des Cougous.

δ . Glabra , foliis basi truncatis , dentibus subhastatis.

Llaurenti , Cagire.

† 5. LEPICAUNE TURBINATA. LaPeyr. *Fl. Pyr.* t. 170.

L. caule simplici erecto , foliisque villosis oblongis , à basi ad medium , retrorsum uncinato-pinnatifidis ; floribus paniculatis ; calycis squamis obtusis linearibus carinatis ciliatis ; seminibus turbinatis. \mathcal{L}

Elle ressemble beaucoup au Multicaulis ; elle en diffère par ses feuilles plus allongées , rares et à très-longs pétioles dans le bas de la tige , ramassées dans le haut , profondément dentées ou pinnatifides jusques vers leur milieu , les dents recourbées en arrière , toutes amplexicaules avec deux oreillettes saillantes ; par ses semences rougeâtres turbinées.

Prairies de Sem et de Goulié , Mail du Cristal.

† 6. LEPICAUNE SPINULOSA. LaPeyr. *Fl. Pyren.* t. 171.

L. glabra multicaulis ; foliis elongato-lanceolatis obtusis profundè erosis dentibus spinulosis , imis petiolatis , caulinis auriculato-amplexicaulibus. \mathcal{L}

A la Vallée d'Eynes par delà la Cueillade non loin de Nouri.

4-5 décimètres ; plusieurs tiges écartées flexueuses grêles ; feuilles radicales pétioles , caulinés embrassantes avec deux grandes oreillettes arrondies , toutes allongées lancéolées obtuses ,

SYNGENESIE. = POLYG. ÉGALE. 481

obtusées droites profondément rongées, garnies de petites dents écartées terminées par un léger piquant; fleurs paniculées 8-12 jaunes, pédoncules grêles, écailles du calice grandes lâches membraneuses; semences rougeâtres, aigrettes simples, blanc de neige. La plante est parfaitement glabre et lisse dans toutes ses parties, la base du calice exceptée, il est recouvert par un coton épais et blanc de neige, qui tombe en grande partie à mesure que la fleur se développe. Cette espèce abonde en caractères.

7. LEPICAUNE PRUNELLEFOLIA. LaPeyr. *Hieracium pumilum*. LIN. Mant. 279. *Crepis pygmæa*. LIN. sp. 1131. *Leontodon dentatum*. LIN. Mant. 107. *Hieracium prunellæfolium*. GOUAN. Ill. t. 22. f. 3. VILL. Dauph. ALLIO. Pedem. t. 15. f. 2.

L. caule procumbente, basi ramoso paucifloro; foliis ovatis, basi inæqualibus, denticulatis petiolatis, petiolis dentatis; pedunculis calycibusque tomentosus. WILLD. Squamis calycinis interioribus lineari-acuminatis, corollas subæquantibus; seminibus sulcatis. LAPeyr. WILLD. sp. 3. p. 1574. ℥

Feuilles glabres en-dessous, poils ras blancs couchés en différens sens en-dessus; elles sont toujours couleur de lie de vin.

Fleurs jaune rougeâtre.

Sur les sommets. Cambredases, Vallée d'Eynes, Mail du Cristal, Clot del Toro à la Maladetta, Pennablanca, Port de la Picade, de Massive, Glaciers d'Oo, Cau d'Espade, Pen du Brada, Houle du Marboré, Port de Boucharo, au milieu des débris des roches.

8. LEPICAUNE ALBIDA. LaPeyr. *Crepis albida*. VILL. ALLIO. JACQ. Ic. rar. 1. p. *Hypochaeris taraxacoides*. POURRET.

L. foliis cano-scabris, radicalibus runcinato-dentatis, caulinis oblongo-lanceolatis subamplexicaulibus subdentatis; calycinis squamis margine membranaceis ciliatis. WILLD. sp. 3. p. 1596. ℥

Fleurs d'un jaune clair.

Le long des ravins, sur les roches basses. Sem, Marignac à la Tour, bas du Port de Benasque, au midi parmi les débris des roches, Saint-Justin à Barèges, Endretlis.

β. Foliis integris vix denticulatis. ALLIO. Pedem. t. 32. f. 3.

Ambouilla, la Trancade, Font de Comps dans le bois.

† 9. LEPICAUNE TOMENTOSA. LaPeyr. Fl. Pyren.-t. 172.

L. tomentosa; foliis imis orbiculatis dentatis petiolatis, caulinis acuminato-lanceolatis integris subamplexicaulibus; calycis squamis exterioribus linearibus patulis arachnoideis, interioribus subglabris adpressis sulcatis scariosis erectis, ligulas excedentibus. ℥

Fleurs jaunes.