

## SYNGENESIE. = POLYG. ÉGALE. 481

obtusées droites profondément rongées, garnies de petites dents écartées terminées par un léger piquant; fleurs paniculées 8-12 jaunes, pédoncules grêles, écailles du calice grandes lâches membraneuses; semences rougeâtres, aigrettes simples, blanc de neige. La plante est parfaitement glabre et lisse dans toutes ses parties, la base du calice exceptée, il est recouvert par un coton épais et blanc de neige, qui tombe en grande partie à mesure que la fleur se développe. Cette espèce abonde en caractères.

7. LEPICAUNE PRUNELLEFOLIA. LaPeyr. *Hieracium pumilum*. LIN. Mant. 279. *Crepis pygmæa*. LIN. sp. 1131. *Leontodon dentatum*. LIN. Mant. 107. *Hieracium prunellæ-folium*. GOUAN. Ill. t. 22. f. 3. VILL. Dauph. ALLIO. Pedem. t. 15. f. 2.

L. caule procumbente, basi ramoso paucifloro; foliis ovatis, basi inæqualibus, denticulatis petiolatis, petiolis dentatis; pedunculis calycibusque tomentosus. WILLD. Squamis calycinis interioribus lineari-acuminatis, corollas subæquantibus; seminibus sulcatis. LAPEYR. WILLD. sp. 3. p. 1574. ℥

Feuilles glabres en-dessous, poils ras blancs couchés en différens sens en-dessus; elles sont toujours couleur de lie de vin.

Fleurs jaune rougeâtre.

Sur les sommets. Cambredases, Vallée d'Eynes, Mail du Cristal, Clot del Toro à la Maladetta, Pennablanca, Port de la Picade, de Massive, Glaciers d'Oo, Cau d'Espade, Pen du Brada, Houle du Marboré, Port de Boucharo, au milieu des débris des roches.

8. LEPICAUNE ALBIDA. LaPeyr. *Crepis albida*. VILL. ALLIO. JACQ. Ic. rar. 1. p. *Hypochaeris taraxacoides*. POURRET.

L. foliis cano-scabris, radicalibus runcinato-dentatis, caulinis oblongo-lanceolatis subamplexicaulibus subdentatis; calycinis squamis margine membranaceis ciliatis. WILLD. sp. 3. p. 1596. ℥

Fleurs d'un jaune clair.

Le long des ravins, sur les roches basses. Sem, Marignac à la Tour, bas du Port de Benasque, au midi parmi les débris des roches, Saint-Justin à Barèges, Endretlis.

β. Foliis integris vix denticulatis. ALLIO. Pedem. t. 32. f. 3.

Ambouilla, la Trancade, Font de Comps dans le bois.

† 9. LEPICAUNE TOMENTOSA. LaPeyr. Fl. Pyren.-t. 172.

L. tomentosa; foliis imis orbiculatis dentatis petiolatis, caulinis acuminato-lanceolatis integris subamplexicaulibus; calycis squamis exterioribus linearibus patulis arachnoideis, interioribus subglabris adpressis sulcatis scariosis erectis, ligulas excedentibus. ℥

Fleurs jaunes.

482 SYNGENESIE. = POLYG. ÉGALE.

Commune dans le bois à la *Font de Comps*, au sud-est de la fontaine.

*Elle a de grands rapports avec la précédente ; les différences essentielles que présente la structure du calice ne permettent pas de les réunir.*

CREPIS. *Recept. nudum. Cal. calyculatus squamis deciduis. Pappus pilosus substipitatus.*

1. CREPIS NEMAUSENSIS. Gouan. ALLIO. *Pedem. Hieracium sanctum. LIN. sp. 1127. Andryala nemausensis. VILL. Dauph. 3. p. 66. t. 26.*

C. foliis runcinato-lyratis obtusis dentatis ; scapo nudo multifloro, hispido ; calycinis squamis margine membranaceis. WILLD. *sp. 3. p. 1592. ☉*

β. *Glabra uniflora, foliis runcinato-dentatis.*

Fleurs jaunes.

Sur les murs, les tertres secs et chauds. Commune au *Fitou de Bagnols*, et à *Toulouse*.

2. CREPIS APARGIOIDES. Willd. *Hieracium stipitatum. MURR. Syst. veg. JACQ. Aust. t. 293.*

C. foliis lanceolato-obovatis dentatis glabris, caulinis linearilanceolatis ; caule angulato, infernè scabro ; pedunculis calycibusque hispidis. WILLD. *sp. 3. p. 1594. ☉*

*Elle appartient aux Leontodon par son aigrette stipitée ; elle en diffère par le port et les semences, elle ne peut rester parmi les Crepis et doit constituer un genre à part.*

Fleurs jaunes.

Prairies de *Sem*, d'*Olbié*, de *Goulié*, de *Sentenac* où elle abonde.

3. CREPIS TAURINENSIS. Willd. C. *vesicaria. BALBIS. Taurin. C. polymorpha. POURRET. Barkhausia taraxacifolia. DECAND. Fl. franc. n.º 2949.*

C. foliis scabris, radicalibus lyrato-runcinatis, caulinis lanceolatis amplexicaulibus, basi dentatis ; calycibus subtomentosis, squamis exterioribus margine membranaceis. WILLD. *sp. 3. p. 1595. ☉*

*Le calice est tomenteux et velu ; les semences sont ciliées ; celles du rayon sont enveloppées dans une écaille ; l'aigrette est stipitée ; la racine est plus grosse à son extrémité qu'au collet.*

Fleurs jaunes.

Prairies sèches, le long des haies, lisières des champs. A *Saleix*, *Orus*, *Saint-Béat* le long des chemins.

β. *Minor. C. præcox. BALB. Miscel. t. 9.*

A *Vieille*, vallon de *Cazaril d'Aran*, haies et pierres.

γ. *Villosa, ramosa ; foliis omnibus runcinato-pinnatis.*

A *Can-Campa*, à *Saleix*.