

480 SYNGENESIE. = POLYG. ÉGALE.

4. LEPICAUNE MULTICAULIS. LaPeyr. *Fl. Pyren.* t. 169. H. *Pyrenaicum*. LIN. *Syst. nat.*

L. caule erecto simplici sulcato glabriusculo ; foliis radicalibus oblongis basi profundè dentatis , caulinis lanceolatis , hastato-sagittatis amplexicaulibus dentatis. WILLD. (Calycis squamæ lineares obtusæ triquetrae patentés recurvæ carinatae , oris et carinâ ciliatis) LAPEYR. WILLD. *sp.* 3. p. 1582. π

Hieracium Pyrenaicum majus Blattariæ folio hirsutius. TOURNEF. *Topog. et Inst.* 472.

Elle se fait distinguer par la grandeur le nombre et le brillant de ses fleurs couleur d'or , et par ses calices presque blanchis par la quantité de poils qui les recouvrent ; ses semences sont aiguës et cendrées.

Prairies alpines , gazons des sommets. Aux Canals de Lecca , à Madres , au Llaurenti , Sem , Goulié , Olbié , Port de Coumebiere , Pic de Gard , Esquierry , Labatsec , lacs d'Oo , les Cougous , sommet du Port de Pinede.

β . Major , ramosa , latifolia. HERM. *Parad. t.* 184.

Au Llaurenti , Cagire.

γ . Minor simplex uniflora.

Hieracium austriacum. JACQ. *Aust. t.* 441. *Crepis austriaca.* JACQ.

M. d'Esquierry , des Cougous.

δ . Glabra , foliis basi truncatis , dentibus subhastatis.

Llaurenti , Cagire.

† 5. LEPICAUNE TURBINATA. LaPeyr. *Fl. Pyr. t.* 170.

L. caule simplici erecto , foliisque villosis oblongis , à basi ad medium , retrorsum uncinato-pinnatifidis ; floribus paniculatis ; calycis squamis obtusis linearibus carinatis ciliatis ; seminibus turbinatis. π

Elle ressemble beaucoup au Multicaulis ; elle en diffère par ses feuilles plus allongées , rares et à très-longs pétioles dans le bas de la tige , ramassées dans le haut , profondément dentées ou pinnatifides jusques vers leur milieu , les dents recourbées en arrière , toutes amplexicaules avec deux oreillettes saillantes ; par ses semences rougeâtres turbinées.

Prairies de Sem et de Goulié , Mail du Cristal.

† 6. LEPICAUNE SPINULOSA. LaPeyr. *Fl. Pyren. t.* 171.

L. glabra multicaulis ; foliis elongato-lanceolatis obtusis profondè erosis dentibus spinulosis , imis petiolatis , caulinis auriculato-amplexicaulibus. π

A la Vallée d'Eynes par delà la Cueillade non loin de Nouri.

4-5 décimètres ; plusieurs tiges écartées flexueuses grêles ; feuilles radicales pétiolées , caulinés embrassantes avec deux grandes oreillettes arrondies , toutes allongées lancéolées obtuses ,