

461. LIMONÓSERIS PETERM. Wiesensalat.

Periclinium subuniseriale, polyphyllomum, basi phyllomatibus pluribus auctum. Flores omnes hermaphroditi. Corollae omnes glossidiodes. Receptaculum ebracteolatum, dilacerato-alveolatum. Achaenia fusiformia, valleculosa, apice attenuata, pappo piloso, sessili. — Caulis; pappus albus. [*Fam. Compositae-Homoianthae Rchb.*]

1189. *L. biennis* PETERM.: inferne hispidula; folia pinnatifida, margine subtiliter denticulato-scabra, inferiora hispidula, caulina sessilia, suprema lanceolata, basi subpinnatifida; calathanthia corymbosa; phyllomata dorso hispidula vel plus minusve pubescentia; achaenia lanceolato-fusiformia. — *Crepis biennis* Lin., *Hedypnois biennis* Scop. — Schkr. t. 222., Engl. Bot. t. 149. — Bi- tripedalis et altior, valida; folia plus minusve pinnatifida vel dilacerato-pinnatifida, certe inferiora plus minusve hispidula; achaenia cinnamomea. — Forma primaria; phyllomata dorso hispidula.

β. pubescens: phyllomata plus minusve pubescentia, neque vero hispidula.

In pratis, graminosis, ad vias et agros frequentissima, e. c. in silvis Rosenthal, Nonne, ad praedium Brandvorwerk, ad pagos Konnewitz, Schleussig, Schönfeld, Leutzsch etc. — Fl. Jun. — Ang. ☉.

462. GERÁCIUM RCHB. Sperberkraut.

Periclinium polyphyllomum, basi phyllomatibus accessoriis minoribus auctum. Flores omnes hermaphroditi. Corollae omnes glossidiodes. Receptaculum ebracteolatum, subfoveolato-tuberculatum. Achaenia oblonga vel ovalia, truncata vel obtusa, valleculosa, pappo piloso, sessili. — Scapus vel caulis. [*Fam. Compositae-Homoianthae Rchb.*]

1190. *G. succisaefolium* RCHB.: caulis subhirsutiusculus; folia basilaria petiolata, oblonga, obtusa, repando-subdentata vel subintegerrima, subpubescentia, caulina pauca, cordato-amplexantia, subdecurrentia, oblongo-lanceolata, subintegerrima; calathanthia corymbosa; periclinium nigro-glanduloso-hispidulum. — *Hieracium succisaefolium* All., *Hieracium molle* Jacq., *Hieracium integerrimum* Hopp., *Crepis hieracioides* W. K. — Sturm Fl. D. H. 39., Jacq. austr. t. 119., Wald. Kit. pl. r. hung. t. 70. — Flores fere crocei.

In pratis editioribus, montosis, e. c. in pratis ad pagum Gross-Dölzig frequens. — Fl. Jun. — Aug. ♀.