

18. LYGODESMIA. *Involucrum pentaphyllum, tubulatum, basi squamis plurimis brevissimis imbricatis munitum : foliolis ligulatis, carinatis, margine scariosis. Receptaculum scrobiculatum. Flosculi 5. Antheræ basi bidentatae. Achenia linearia, compressa, sulcata, apice simplicia. Pappus capillaris : radiis multiplici ordine copiosissimis, denticulato-scabris, subpersistentibus.*

Suffrutices (Amer. Bor. et Syriæ) scie Ephedræ, ramosissimi, aphylli : ramis teretibus sulcatis v. triquetris, squamis (foliorum rudimentis) subulatis, patulis, sparsis. Flores solitarii, sessiles. Pappus comosus, fuscescens.

Huc Prenanthes juncea Pursh. P. pumila Baldw. P. triquetra Labill. Genus facie et charactere omnino diversissimum.

19. ATALANTHUS. *Involucrum cylindricum, polyphyllum, imbricatum : squamis membranaceis, adpressis. Receptaculum favosum. Flosculi indefiniti. Antheræ basi. bisetae. Stigmata filiformia, spiraliè tortuosa. Achenia linearia, ancipiti-compressa, sulcata, apice simplicia. Pappus tenuissimè capillaceus, mollissimus, fugax : radiis basi fasciculatim connexis ; aliis intermediis longioribus, duplo crassioribusque.*

Frutices (Ins. Can. et Mediterran. rupibus littoreis proprii) ramosissimi. Folia pinnatifida. Flores aurei, solitarii v. corymbosi. Pappus niveus.

Huc Prenanthes pinnata L. P. spinosa Vahl.

20. SONCHUS. *Involucrum polyphyllum, adpresso imbricatum, basi dilatum, apice connivens. Receptaculum scrobiculatum, scrobiculorum marginibus elevatis laceratis scabrum, leviter favosum. Flosculi indefiniti ; favoë extus villosissimam. Antheræ basi acutè bidentatae. Stigmata hispidula. Achenia ancipiti-compressa, sulcata, jugis transversim rugosissimæ, apice simplicia. Pappus tenuissimè capillaceus, mollissimus, fugax : radiis copiosissimis, inæqualibus, basi fasciculatim connatis !*

Herbae (Europææ) robustæ, radice perenni. Folia saxis runcinata. Flores aurei, corymbosi, raro subsolitarii.

Huc Sonchus arvensis L. S. palustris L., et planta Pallasiana floribus subsolitariis, involucris laevibus. S. oleraceus parum differt radice annua, et receptaculo glabro.

21. BARKHAUSIA. *Involucrum simplici ordine poly (7-8)-phyllum, connivens, torulosum, basi squamis pluribus (8-9) dilatatis, scariosis calyculatum. Receptaculum favosum : laciniis ciliatis. Flosculi indefiniti. Antheræ basi bisetae. Stigmata filiformia, spiraliè revoluta, minutè papillosa. Achenia fusiformia, sulcata, leviter muricata, apice attenuatæ, elongata, scabro. Pappi radiis triplici ordine digestis, tenuissimè capillaceis, denticulatis.*

Herbe (Europææ) erectæ, ramosæ, radice annua. Flores solitarii, longe pedunculati.

Huc referendæ Crepis alpina L. C. rubra L. An etiam C. vesicaria L. et Barkhausia purpurea et hyemalis Bivon ?