

1197. *LYCHNIS MEDIA* HORTOR. *L. tomentosa*; foliis oblongis acutis; floribus paniculato-cymosis; pedicellis calyce aequaliter costato multo longioribus; petalorum lamina emarginata longitudine latitudinem aequante; corona erecto-patente inermi. Hab. ? *Q.* —

Affines *L. coronaria* et *L. Flos Jovis* sequenti modo definiendae :

*L. CORONARIA* LAM. *L. tomentosa*; foliis oblongis acutis; floribus paniculato-cymosis; pedicellis calyce multo longioribus; calycis costis alternis alatis; petalorum lamina haud emarginata longitudine latitudinem aequante; corona connivente subpungente.

*L. FLOS JOVIS* LAM. *L. tomentosa*; foliis oblongis acutis; floribus capitato-cymosis; pedicellis calyce aequaliter costato brevioribus: petalorum lamina profunde emarginata longitudine latitudinem fere bis superante; corona patentissima inermi.

1204. *MACRORHYNCHUS AURANTIACUS* FISCH. et MEX. *M. perennis*, scapigerus; periclinii squamis adpressis; achaeniis obtuse costatis longitudine rostri. — Flores aurantiaci, subcuprei. — Hab. ? Semina accepimus ex horto Regio botanico Berolinensi. *Q.*

1205. *MACRORHYNCHUS LAEVIGATUS* FISCH. et MEX. *M. annuus*, caulescens; periclinii squamis squarrosis; achaeniis rostro sublongioribus teretiusculis subangulatis. *M. laevigatus* *Ind. secund. sem. h. Petropol. p. 41.*

1206. *MACRORHYNCHUS PTEROCARPUS* FISCH. et MEX. *M. annuus* caulescens; periclinii squamis squarrosis; achaeniis rostro subbrevioribus alato-costatis. — *M. pterocarpus l. c.*

1305. *MYOSOTIS CAESPITOSA* SCHULTZ. In hortis occurrit s. n. *M. micranthae Biv.*

β *MACROCALYX*: calycibus fructiferis subbilabiatis 4 lin. longis. — Hab. prope Lenkoran.