

- costatis rostro subbrevioribus. (F) in Chili ad Quillota in pascuis saxosis legit cl. Bertero! Taraxacum caulescens Moris! *mém. acad. tur.* 37. p. 108. t. 34. Variat foliis integerrimis dentatis aut ferè pinnatifidis semper plùs minùs villonis. Scapus foliis duplò triplòve longior, rariùs iis æqualis. (v. s. comm. à cl. Bertero et Moris.)
2. M. LÆVIGATUS (Fisch. et Mey. ind. sem. h. petr. 1835. p. 41. 1837. p. 40), invol. squamis exterioribus subsquarrosis villis albis hirsutis, achæniis costis obtusissimis suberosis instructis. (I) in pascuis arenosis collium et planitie ad Rancagna Chilensium legit cl. Bertero! M. Chilensis Less. syn. 139? An huc referendus M. Chilensis Hook. et Arn. comp. 2. p. 42. in insul. Falkland lectus? Folia et caulis prioris, sed glabriuscula. (v. s. comm. à cl. Bertero.)
3. M. PŒPPIGII, invol. glabriusculi squamis adpressis. (I) in Chili australi ad Antuco legit cl. Pœppig. Barkausia? scapigera Kunze! in Pœpp. pl. exs. 3. n. 182 (20). Valdè accedit ad priores, sed folia angustiora. Scapus foliis duplò triplòve longior. Invol. squamæ inter se subæquales glabriusculæ. Achænia specim. mei immatura brevissimè rostrata. (v. s.)
4. M. AURANTIACUS (Fisch. et Mey. ind. sem. h. petr. 1837. p. 40), scapigerus, invol. squamis adpressis, achæniis obtusè costatis longitudine rostri. ♀ patr. ign. Flores aurantiaci subcuprei.
5. M. PUMILUS, invol. villis rufescentibus fortè glanduloso-hispidis — in insulis Maclovianis sen Falklandianis, Taraxacum pumilum Gaudich. ann. sc. nat. 5. p. 103. Ixeris monocephala Cass. dict. 39. p. 389. Folia linearia integerrima suprâ glabra subtùs villosa, scapi plurimi graciles per anthesin pollicares demùm bipollicares. Capit. 12-flora. Ex involucri squamis exterioribus foliaceis interiores ferè æquantibus et ex patriâ ad Macrorhynchum pertinere videtur, sed Cassini qui fructum juniorem vidit achænia brevius rostrata et costas subalatas dixit.

DCCCXXV. BARKHAUSIA *Mœnch meth.* 537. *DC. fl. fr. ed.* 3. v. 4. p. 41. *Reich. fl. exc.* 1. p. 255. *excl. sect. 1^a. Less. syn.* 136. *Griess. in linnæâ* 1830. p. 417. — *Barkhusenia Hoppe in florâ* 1829. p. 519. — *Borkhausia Bœhm.* . . . *Spreng. syst.* 3. p. 651. — *Borkhausia et Lagoseris Link. enum.* 2. p. 289. — *Barkhausia, Paleya et Anisoderis Cass.* — *Crepis Linn. syst. nat.* — *Crepidis Linn. et uuct.* — *Crenami sp. Adans.* — *Closiospermum Neck. clem.* 1. p. 54?

Capit. multiflorum. Invol. calyculatum aut rariùs subimbricatum. Recept. nudiusculum seu piloso-fimbrilliferum. Achænia exalata tere-tia, nunc omnia, nunc tantùm centralia in rostrum longum sensim atten-uata, marginalia nunc erostria nunc breviter rostrata. Pappus mul-tiserialis pilosus albus. — Herbæ pleræque Europææ, annuæ aut perennes, habitu Crepides referentes. Folia dentata aut pinnatilobata. Corollæ flavæ aut rariùs purpurascentes.

Sect. I. PALEYA. — *Paleyâ Cass. dict.* 39. p. 393.

Achænia disci et radii æqualiter et longè rostrata. Invol. imbricatum, squamæ nempè exteriores sensim nec abruptè in interiores abeuntes.

1. B. ALBIDA (Cass. dict. 26. p. 62), caule subnudo simplici aut bifido, foliis sub-canescenti-scabridis plerisque radicalibus runcinato-dentatis, caulinis subam-plexicaulibus lanceolato-oblongis. ♀ in pratis lapidosis Pyrenæorum orient. et centralium, Alpium Delphinensium et Pedemontanarum, ad rupium fissuras in monte Pico de Arvas Asturiensi (Durieu!) et in montib. calcareis Hisp. Granatensis (Boiss!). *Crepis albida Vill. danph.* 3. p. 139. t. 33. *All. ped.* t. 32. f. 3. *Picridium albidum DC. fl. fr.* 4. p. 16. *Paleyâ albida Cass. dict.* 39. p. 393. *Lepicaune albida Lapeyr.* Invol. imbricatum squamis margine albidis. Cap-*it. amplum pallidè flavum ferè Urospermi Dalechampi.* Radix crassa. Sponta-nea subcaulis, culta sæpè caulescens foliosa. (v. v. et s.)