

culatum, 5-7-phyllum, foliolis calyculi lanceolatis, acutis, involucri proprii subquincuncialibus, linearibus, obtusis, glaberrimis, margine submembranaceis. FLOSCULI violacei, 5-6 in singulo capitulo; tubo gracili, 5-nervi, glabro; limbo lineari, 5-dentato, dentibus inæqualibus, linearibus v. ovatis, summo apice plus minusve papilloso-hirsutis. STAMINA exserta, tubo medio inserta; filamenta glabra, apice vix incrassata; antheræ lineares, loculis basi in membranulam tenuem, lacerato-fimbriatam, desinentibus. STYLUS tubum stamineum superans, dimidiâ inferiore parte glaber, superiore papillosus, bifidus, ramis linearibus, arcuatis, papillosis, coloratis. FRUCTUS oblongus, basi subattenuatus, striatus, glaber, disco epigyno parvo umbilicatus. PAPPUS setis tenuissimis, argenteis.

In nemoribus vallis *Buspa*, usque ad sylvarum fines, trans *Bouroun-Ghauti*; alt. 12,000 ped. angl. circiter. Floret ineunte Augusto.

Explicat. Tab. 108.

1. Flosculus.

2. Stamen anticè visum.

3. Fructus; pappi setis subomnino ablati ut discus epigynus pateat.

MELANOSERIS +.

CAPITULUM multiflorum. INVOLUCRUM campanulatum, caliculatum, foliolis laxis, tenuibus, erectis. RECEPTACULUM nudum angustum. FLOSCULI cærulei. FRUCTUS oblongi, scabri, in rostrum teretem levem longè attenuati. PAPPUS setis numerosis rigidiusculis scabridis albidis. — Herbæ biennes himalaianæ, radice fusiformi, foliis subintegris v. lyratis, inflorescentiâ thyrsoidèâ, capitulis anthesi peractâ reflexis, foliolis lividis, villis nigris infernè onustis, flosculis cæruleis, fructibus longè rostratis, papposis.

MELANOSERIS LYRATA. D^{ns}. Tab. 109.

M. foliis lyratis, lobis lanceolatis, terminali reniformi-cordato v. lanceolato, abruptè acuminatis.

HERBA biennis 2-3 decimetr. glabra. RADIX fusiformis, crassiuscula, fibrillas emittens tenues, numerosas. CAULIS erectus, foliatus, levis, herbaceus. FOLIA radicalia...; ima