

albo-scariosis instructis, in petiolum attenuatis, caulinis vix ullis, capitulis breviter pedicellatis racemoso-spicatis distantibus bracteolatis. \mathcal{U} in Ægypto inferiore ad Pyramides (Delil!), in palmetis Arabiæ propè Meccam (Schimp.! n. 856 et 992). Chondrilla nudicaulis Linn. mant. 278. Lactuca nudicaulis Murr. nov. comm. gett. 3. p. 74. t. 4. Sonchus divaricatus Delil! fl. eg. ill. non Desf. (v. s.)

β . *divaricatus*, canle decumbente parcè folioso dichotomo, foliis runcinatis, caulinis aurito-amplexicaulibus. — in Ægypto (Desf. Savi! Raddi! Acerbi!) in Arabia petraæ valle Hammæ (Schimp.! n. 430), in agro Tunetano? (Vahl!) et in ins. Canariensis Teneriffâ Lancerote et magn. Canariâ (Sm.). Lomatolepis nudicanlis Cass. dict. 48. p. 422. Sonchus dichotomus Savi! eos. bot. p. 10. non Bieb. Microrhynchus nudicaulis Fresen. pl. eg. p. 87. Scorzonera dichotoma Vahl symb. 2. p. 89? Lactuca flava Forsk. fl. ag. ar. p. 143? Achænum subtetragonum truncatum transversè muricatum vix ac ne vix subrostellatum. (v. s.)

2. M. *PATENS*, subglaucescens, caulis erectiusculis patentim ramoso-paniculatis basi parcè foliosis, foliis runcinatis dentibus albo-scariosis instructis, radicalibus in petiolum angustatis, caulinis aurito-semiamplexicanibus, capitulis secùs ramos breviter pedicellatis, pedicellis bracteatis. \mathcal{U} in Indiâ orient. ad Kamaon, Patna, Oude (Wall!). Prenanthes patens Wall! cat. comp. n. 368. Achænum obtusè tetragonum, brevissimè sed distinctè rostratum. Herba prioris var. β simillima, forte à M. nudicauli non diversa? (v. s.)

3. M. *ASPLENIFOLIUS*, glaber, caulis plurimis nudiusculis adscendentibus dichotomis, foliis radicalibus subsessilibus pinnatifidis runcinatis, lobis obtusis denticulatis, paniculâ laxâ subnudâ. (2) seu \mathcal{U} Roxb. in cultis Bengali et arenosis Coromandeliæ. Prenanthes asplenifolia Willd. sp. 3. p. 1540. Hieracium dichotomum Roxb. fl. ind. 3. p. 404. Prenanthes dichotoma Wall! cat. n. 3275. comp. 385. Achænia longitudinaliter costata (nec ut in Pieridio transversè striata) apice subtruncata. Pappus albus. (v. s.)

§. 2. *Caulibus procumbentibus sapè radicantibus, foliis ad collum et nodos fasciculatis sapè bistipulatis.* — Launæa Cass.

4. M. *SARMENTOSUS*, caulis flagelliferis filiformibus procumbentibus hinc indè radices et folia gerentibus, foliis confertis sinuato-pinnatifidis, lobis obtusis aut subacutis, pedunculis 1-cephalis folio subbrevioribus apice bracteas squamosas subimbricatas margine scariosas gerentibus. \mathcal{U} in arenosis maritimis Indiæ orientalis, versus Negapatam (Wight!), in Coromandeliâ (Roxb.), insulis Pulo-Pinang (Wall!), Mauritii (Bouton!) et Borboniae (Bory!). Prenanthes sarmentosa Willd. sp. 3. p. 1540. phyt. 10. n. 35. t. 6. f. 2. Wall! cat. n. 3262. Lactuca sarmentosa Wight (contrib. p. 27. Launæa pinnatifida Cass.! ann. sc. nat. 23. p. 85. opusc. 3. p. 82. Achænia obtusè tetragona ferè lœvia erostria. — Icon Schaw. app. n. 146. t. 39 huc forte pertinet, sed folia nostra pl. non sunt pilosa. (v. s.)

5. M. *BELLIDIFOLIUS*, caulis humifusis flagelliformibus, foliis ovatis subintegris obtusis basi longè attenuatis sinuato-dentatis, pedicellis è nodis inter folia ortis bracteatis. \mathcal{U} in arenis maritimis insulae Madagascar (Comm.), propè pagum Tamatave (Bojer!). Launæa bellidifolia Cass. dict. 25. p. 321. Folia submembranacea, 2 poll. longa, 4-5 lin. ad apicem lata, parte petioliformi limbo duplò longiore. Achænia obtusè 4-5-gona, rostro brevi (nec nullo ut vult cl. auct.) donata. (v. s. comm. à cl. Bojer.)

6. M. *DREGEANUS*, caulis humifusis flagelliformibus, foliis obovatis crebrè calloso-denticulatis obtusis in petiolum brevissimè attenuatis, pedicellis è nodis inter folia fasciculata ortis bracteatis folio brevioribus. \mathcal{U} in Africâ austr.-orientali ad Zwarte Omsanceno et Omcomas legit cl. Dregé! Folia 2 poll. longa, pollicem lata, parte petioliformi limbo quintuplò breviori. Achænia obtusè tetragona, vix ac ne vix subrugulosa, rostro brevissimo donata. (v. s.)