

Distributio. In Malaya. In Asia occidentali. In omni Europa :
et in fere tota orbe terrarum inquilina.

Var. β . parvulus. Caulis 6-pollicaris : folia et capitula minora.
Involucrum et achænia eadem.

Hab. A Lahore misit Dr. Stewart.

(3.) *Sonchus Hotha* nov. sp.

Folia caulina oblongo-lanceolata, basi sessilia cordata auriculis
brevibus sed acutis. Capitula anguste cylindrica c. 6 flora,
glabra. Phyllaria interiora c. 6 valde angusta basi post an-
thesin incrassata, exteriora parva. Achænia vix compressa
utrinque angustata multi-striata lævia fusca. Pappus albus.

Hab. In Hotha in Burma superiore leg. Dr. T. Anderson.

Hæc species a Kurz ad Prenanthidem relata est. Phyllaria
basi post anthesin incrassata : et folia omnino Sonchi.

(4.) *Sonchus arvensis* L. in Koch Synops. Flor. Germ. p. 371
DC. VII. p. 187 *Sonchus Wightianus* DC. VII. p. 187
Wight Icon. t. 1142 *Sonchus orixensis* Roxb. Flor. Ind. III.
p. 402.

Folia lanceolata runcinata, caulina sessilia basi cordata, supre-
ma integra. Pedunculi cum phyllariis glanduloso-pilosi.
Achænia vix compressa costis crassiusculis transverse mu-
ricatis.

Hab. In Bengalia ; prope Calcuttam. In omni Himalaya sparsa.
In montibus Nilgherry.

Var. β . Phyllaria glabriuscula. Ad Lahore leg. Dr. Stewart et
Dr. Brandis.

Distributio. In cultis Europæ et Asiæ. In America inquilina.

MICRORRHYNCHUS Less. (Bth. Gen. 756.)

(1.) *Microrrhynchus asplenifolius* DC. VII. p. 181. *Prenanthes*
dichotoma Wallich Cat. 3275 *Prenanthes asplenifolia* Roxb.
Flor. Ind. III. p. 404.

Glaber. Caules erecti nudiusculi dichotomi. Folia radicalia ob-
longa pinnatifida runcinatave lobis obtusis. Capitula subpa-
niculata. Achænium oblongum, basi et apice truncatum, cos-
tis crassis rugosis 10-12 longitudinaliter striatum. Pappus
albus.

Hab. In Bengalia vulgaris : mensibus Jan.-Jun. præcipue flo-
rens. In Madras ; in planitie Gangetica superiore et Punjab.

(2.) *Microrrhynchus secundus* i. e. *Chondrilla secunda* Royle

in Herb. An *Microrrhynchus arabicus* Jaub. et Spach in Walp. Ann. II. 977.

Glaber. Caules elongati 1-2-pedales viminei superne nudi. Folia inferiora caulina sessilia basi dilatata, elongato-oblonga supra latiora, pinnatifida lobis acute dentatis. Capitula secus ramos quasi-racemosa. Achænia oblonga, apice et basi truncata, hand compressa, costis crassis 10-12 vix rugulosis longitudinaliter striatum. Pappus albus.

Hab. In India boreali-occidentali leg. Royle. In Punjab ad 3,500 ped. alt. leg. Stewart.

Species omnino *Lactucam* obtusam supra referens et cum eâ in Herbariis admixta ; sed achænium minime sub disco pap-pifero constrictum est. In Calcutta Herbario nomen *Chondrilla racemosa* Don etiam adfixum est : *Chondrilla racemosa* Poir. est *Lactuca Heyneana* (aut *Lactuca obtusa* ?) supra.

(3.) *Microrrhynchus sarmentosus* DC. VII. p. 181 Thwaites C. P. 1746.

Glaber. Caules flagelliformes ad nodos radicantes. Folia radicalia oblonga runcinato-pinnatifida. Capitula ad nodos cum foliis 1-3 parvis breviter pedunculata. Pedunculi 1-2-cephali bracteolas squamosas gerentes. Achænia elongato-oblonga, apice et basi truncata, costis crassis 4-5 lævibus. Pappus albus.

Hab. In maritimis arenosis Bengalie, in Cuttack, mense Martio florens. In maritimis arenosis provinciæ Madras et Zeylanie.

Distributio. In Mauritius, Borbonia et Pulo Penang ex DC.

(4.) *Microrrhynchus chondrilloides* i. e. *Zollikoferia chondrilloides* DC. VII. p. 183 *Sonchus Candolleanus* Jaub. et Spach in Walp. Ann. II. 979.

Fere glaber. Caulis erectus paniculato-ramosus. Folia varie pinnatilobata aut linearia remote dentata, infima basi attenuata, superiora cordato-semiamplexicaulia. Pedicelli longiusculi parce bracteati. Capitula erecta anguste ovata. Phyllaria elliptica apice producta subcallosa obtusa. Achænium anguste oblongum, apice et basi truncatum, costis 4-5 crassis lævibus, minutissime papillosum. Pappus sordide albus achænio 1-2-plo longior.

Hab. In Lahul in Himalaya boreali-occidentali leg. Hay. In Scinde et Punjab, in multis locis ex T. Thoms. in ms.