

4. { Involucri phylla 7 mm. longa, caulis basi hirsutissimus. — Washington, ad Mason City (*Sandberg!*).
Hieracium candelabrum Gdgr.
4. { Involucri phylla 10 mm. longa, caulis basi glaber. — Wyoming, ad Centennial Valley (*Nelson n. 1678!*).
Hieracium Nelsoni Gdgr.
1. { Folia superiora pinnata vel incisa, rami patuli pauciflori, phylla intima involucri 8 mm. longa. — America bor., Texas (*Lindheimer an. 1849-51!*) **Mulgedium Lindheimeri** Gdgr.
1. { Folia sup. pinnata, rami adscendentes multiflori, phylla intima involucri 11 mm. longa. — Amer. bor., Kansas ad Riley (*Norton n. 315!*)..... **Mulgedium polyanthum** Gdgr.
1. { Folia sup. integerrima, rami uniflori, phylla intima 9,5 mm. longa. — America bor., Illinois ad West Pullman (*Lansing n. 668!*)..... **Mulgedium centrale** Gdgr.

Tres præcedentes, quoad habitum, etc., sat dissimiles, prope *M. floridanum* DC. sunt collocandæ.

✓ **Microderis nevadensis** Gdgr. — Biennis prorsus papilloso-canescens ad collum araneosa, folia nervosa primatifida fidis lanceolatis valde ciliatis, pedunculi puberuli tubo incrassati, achenia apice tantum hirtella paleis profunde bifidis.

HAB. : California, Nevada ad Reno (*Doten! Kennedy! Heizer!*).

A *M. linariifolia* Sch. bip. (*Suksdorf n. 5583!*), etc., differt indumento, foliis magis sectis.

Microderis Forsteri Hook. f. in Oceania multum variat; e sequentibus conjice :

1. { Folia incisa vel subpinnatifida..... 2
 { Folia integerrima..... 5
2. { Folia obtusa..... 3
 { Folia lanceolata..... 4
3. { Scapus glaber, phylla intima involucri ligulis subbreviora. — Tasmania, Little Plains (*Simson n. 527!*).
Microderis obtusifolia Gdgr.
3. { Scapus pulverulentus, phylla intima involucri ligulis triplo breviora. — Tasmania, ad Sandy Bay (*Spicer n. 94! ex parte*).
Microderis tenuicula Gdgr.
4. { Calyculus purpureus, folia lata undulata, scapus glaber. — Australia, N. S. Wales ad Tia Falls (*Forsyth!*).
Microderis latifolia Gdgr.
4. { Calyculus viridis, folia angusta plana, scapus fere toto pulverulentus. — Tasmania, ad Kangaroo Point (*Spicer n. 94 p. p.!*)
Microderis tasmanica Gdgr.
5. { Folia lanceolata nervosa 2/3 sup. scapi glabri æquantia, capitula late cylindrico-ovata. — Australia, Victoria ad Sandringham (*Walter!*) **Microderis Walteri** Gdgr.
5. { Folia obtusa vix nervosa 1/3 inf. scapi pulverulenti æquantia, cap. anguste cylindrico-tubulosa. — Nova Zelandia ad Dunedin (*Thomson!*)..... **Microderis neozelandica** Gdgr.