

agréable, et qui est recherché de tous les bestiaux. On peut aussi en faire de la litière. On dit que, mêlée d'une manière convenable dans le tabac, elle lui communique un parfum agréable.

Le millet paradoxal fournit aussi un fourrage qui est aimé des bestiaux. Voyez MIL. (L. D.)

MILLET (*Erpétol.*), nom spécifique d'un crotale que nous avons décrit dans ce Dictionnaire, tom. XII, pag. 46. (H. C.)

MILLET D'AFRIQUE, ou GRAND MILLET, ou GROS MILLET (*Bot.*), noms vulgaires de la houque sorgho. (L. D.)

MILLET D'AMOUR (*Bot.*), un des noms vulgaires du grémil officinal. (L. D.)

MILLET EN BRANCHES (*Bot.*), nom vulgaire du panic millet. (L. D.)

MILLET DE CAFRERIE. (*Bot.*) C'est la houque saccharine. (L. D.)

MILLET A CHANDELLE. (*Bot.*) On donne vulgairement ce nom à la houque à épi. (L. D.)

MILLET DES CHÈVRES. (*Bot.*) C'est la balsamine des bois. (L. D.)

MILLET EN ÉPI, MILLET D'ITALIE (*Bot.*), noms vulgaires du panic cultivé. (L. D.)

MILLET D'ETHIOPIE. (*Bot.*) C'est la houque sorgho. (L. D.)

MILLET GRIS, MILLET PERLÉ (*Bot.*), noms vulgaires du grémil officinal. (L. D.)

MILLET D'INDE ou DE TURQUIE (*Bot.*), noms vulgaires sous lesquels on a désigné la houque sorgho et le maïs. (L. D.)

MILLET JAUNE et MILLET SAUVAGE. (*Bot.*) C'est le mélampyre des prés. (L. D.)

MILLET DE SOLEIL. (*Bot.*) On donne ce nom au grémil. (LEM.)

MILLET DE TURQUIE. Voyez MILLET D'INDE. (L. D.)

MILLINE, *Millina*. (*Bot.*) Ce nouveau genre de plantes, que nous proposons, appartient à l'ordre des synanthérées, à la tribu naturelle des lactucées, et à notre section des lactucées-scorzonérées, dans laquelle nous le plaçons entre les deux genres *Tragopogon* et *Thrinicia*. Voici ses caractères:

Calathide incouronnée, radiatiforme, multiflore, fissi-

flore, androgyniflore. Péricline très-inférieur aux fleurs extérieures, formé de squames subunisériées, un peu inégales, appliquées, oblongues-lancéolées, aiguës au sommet, carénées en dehors, canaliculées en dedans, embrassantes, presque enveloppantes; la base du péricline entourée de squamules surnuméraires, irrégulièrement disposées, inégales, inappliquées, lancéolées-subulées, arquées en dedans. Clinanthe plan, fovéolé, à réseau épais, charnu, denticulé. Fruits tous uniformément aigrettés et collifères, oblongs, subcylindracés, ridés transversalement, prolongés supérieurement en un très-long col grêle, bien distinct de la partie séminifère, et au moins aussi long qu'elle; aigrette grisâtre, composée de squamellules unisériées, à peu près égales, filiformes, laminées à la base, barbées et barbellulées. Corolles portant des poils épars sur le haut du tube et le bas du limbe.

Nous ne connoissons qu'une espèce de ce genre.

MILLINE FAUX-LIONDENT; *Millina leontodontoides*, H. Cass. C'est une plante herbacée, offrant extérieurement beaucoup de ressemblance avec le *leontodon autumnale*; elle est privée de tige proprement dite, et sa racine produit immédiatement des hampes et des feuilles; celles-ci sont peu nombreuses, presque dressées, longues d'environ trois pouces, parsemées de quelques longs poils rares, simples, non fourchus; leur pétiole est grêle, long d'environ quinze lignes; le limbe, long d'environ un pouce et demi, large de trois à quatre lignes, est oblong, runciné inférieurement, entier supérieurement, et muni d'une nervure médiaire saillante sur les deux faces; les hampes sont simples, monocalathides, ascendantes, longues de huit à neuf pouces, cylindriques, striées, glabriuscules, vertes, dénuées de feuilles, mais parsemées de petites écailles ovales inférieurement, subulées supérieurement; le sommet des hampes est très-enflé, obconique, creux en dedans, garni en dehors d'écailles subulées, et surmonté d'une calathide large d'environ dix lignes; les corolles sont jaunes, les extérieures violettes en dessous; le péricline est hérissé de poils; il contient, à l'époque de la maturité, quelques fruits stériles et vides, beaucoup plus allongés que les fruits fertiles parmi lesquels ils se trouvent.

Nous avons observé les caractères génériques et spécifiques