

821. *Mulgedium Bourgaei* Boiss.

Inter Muri et Lentechi, 29 Jul. fl. fr. Panicula fere aphylla; lobi laterales foliorum triangulares acutiusculi. — Inter Betscho et Pari, 16 Aug. fl. fr. Folia medii caulis pubescentia auriculato-amplexicaulia profunde sinuato-lobata lobis latis rotundatis utrinque 1-2, terminali non vel parum majore. Panicula basi foliata 70 cm. alta 16 lata. — Ad ripam laevam fluminis Kliutsch, 1500-1600 m., 25 Aug. fr. Giganteum, 3 m. altum.

Var. *subintegritifolium* nobis.

Folia medii caulis ovato-triangularia acuta breviter petiolata basi subtruncata, superiora lanceolata longe acuminata basi attenuata; panicula ampla ad medium foliata.

*Legimus:* Inter Muri et Lentechi, 29 Jul. fl. fr. Panicula 70 cm. alta 27 lata.

Plantae typi et varietatis altissimae, caule crebre folioso.

822. *Mulgedium abietinum* (Boiss. et Bal. sub *Crepide*) Boiss. Fl. Or. III, p. 802.

In silvis abietinis montis Tetenar, 1800-2000 m., 1 Aug. fl. fr. — In jugo Latpari orient. supra Kala, 5 Aug. fl. fr. — In jugo Utbiri orient. 18 Aug. notavimus. — Utseri in Imeretia, Jul. 1877 fl. (Brotherus). Specimen depauperatum monocephalum.

Foliorum dentes mucrone cylindrico terminati; pedunculi sub anthodio incrassati; involuci phylla intima apice crispula ciliata 11-12 mm. longa; anthodium cum flosculis 20 mm. altum. Achenia fusco-viridia apice vix attenuata, altera compressa facie interna carinata, altera subtetragona aequaliter strigosa, 4 mm. longa 1 lata; pappus 7 mm. longus. Coronula ciliata in apice achenii nulla; an *Crepis*?

823. *Prenanthes purpurea* L.

In jugo Nachar, ultra 2000 m., 29 Aug. fl. fr. — Notavimus in jugo Latpari merid. 4 Aug., et in jugo Utbiri 18 Aug.

*Obs.* Nos exemplaires appartiennent au type qui, dans le Flora Or., n'est indiqué que dans le haut Daghestan.