

dicellatis, invol. glabro 1-seriali brevissimè calyculato. ♀ in Unalaschka (Cham.), in Sitcha (h. ac. petrop.). *Sonchus hastatus* Less. in *linnæa* 1831. p. 99. non Wall. (v. s. comm. ab ill. acad. sc. petrop.)

21. *M. MACRORHIZUM* (Royle illustr. t. 61. f. 1), glabrum, radice grossâ, caulibus plurimis adscendentibus, foliis caulinis amplexicaulibus oblongis obtusis sinuato-dentatis, capitulis pedicellatis subcorymbosis, invol. breviter calyculato. ♀ in Indiâ boreali occid. Cor. cœruleæ. Achæmium brevissimè rostratum. Icon sola prodit. †.

22. *M. LESSERTIANUM*, caule glabro erecto simplici, foliis subintegerrimis lanceolatis, inferioribus basi attenuatis superioribus semiamplexicaulibus, invol. hispido subimbricato. — in Indiâ orient. montanis ad Kamaon et Emodum legit cl. Wallich. *Hieracium Lessertianum* Wall. cat. comp. n. 364. *Sonchi* sp. Frœl. in litt. Certè non *Hieracii* sp. fortè genus proprium Monn. in h. DC. Achænia oblonga compressa striata in rostrum crassum longiusculum producta. (v. s. comm. ab hon. cur. merc. angl. Ind. or.)

β. *dentatum*, radice tuberosâ, foliis denticulatis, racemo secundo. — in Indiâ or. prov. boreali-occid. legit cl. Royle! Fortè species distincta et cum var. α genus sectionemve constituens. (v. s. comm. à cl. inv.)

DCCCXLV. ANISORAMPHUS.

Capit. multiflorum. Invol. calyculato-imbricatum, squamis lato-linearibus, exter. circ. 2-serialibus brevibus, inter. subbiseriatis elongatis. Recept. epaleaceum. Achænia oblonga (ex immaturo statu) compressa striata rostrata, rostro exteriorum brevi, interiorum longiori. Pappus pilosus multiserialis subochroleucus. — Herba Capensis perennis habitu *Hieracii* aut *Hypochæridis*. Radix crassa cylindracea. Folia radicalia oblonga basi subattenuata subretrorsum dentata glabra, caulina paucissima linearia integerrima. Caulis subnudus basi sulcatus glabriusculus, apice parcè ramosus circ. 3-cephalus pilis rigidis nigris hirtus. Invol. squamæ pilis iisdem confertioribus hirtæ. Flores lutei.

1. *A. HYPOCHÆRIDEUS*. ♀ ad Cap. Bonæ-Spei, ad Zwart Klipplatrivier et Zwart Key legit cl. Drege! Herba circ. pedalis. (v. s. comm. à cl. inv.)

DCCCXLVI. PICROSIA *Don trans. soc. linn.* 16. p. 183. *Less. syn.* 143.

Capitulum multiflorum. Invol. 1-seriale 8-phyllum. Recept. nudum. Achænia longè rostrata, imò rostro breviora, fusiformia, longitudinaliter sulcata. Pappus pilosus-mollis (?) caducus-biserialis scabriusculus inæqualis, cinereo-fulvus ex Don. — Herba Brasiliensis erecta lævigata glauca parcè ramosa. Folia caulina semiamplexicaulia lanceolata integerrima aut vix subdentata. Pedunculi nudi 1-cephali. Flores lutei invol. longiores, ligulæ 4-nerviæ. Pappus in meo specim. fortè non satis adulto albus.

1. *P. LONGIFOLIA* (Don l. c.). ♀ in Alpibus Peruvîæ (R. et Pav.), in Brasiliâ (Selow!), in humidis circâ Buenos-Ayres et Mendozam (H. et Arn. comp. 1. p. 32). *Troximon fritillarioides* Less. *syn.* 143. (v. s. comm. à mus. reg. berol.)

DCCCXLVII. *TROXIMON* *Gærtn. fr.* 2. p. 360? *Nutt. gen. am.* 2. p. 127. *Spreng. syst.* 3. p. 633. *Hook. fl. bor. am.* 1. p. 300 non *Raf.* — *Agoseris* *Raf. fl. ludov.* p. 58.

Capit. multiflorum. Invol. imbricatum subconicum, squamis latis extus plûs minùs villosiusculis. Recept. epaleaceum. Achænia teretius-