

- dicellatis, invol. glabro 1-seriali brevissimè calyculato. \mathcal{L} in Unalasccha (Cham.), in Sitcha (h. ac. petrop.). *Sonchus hastatus* Less. in *linnaea* 1831. p. 99. non Wall. (v. s. comm. ab ill. acad. sc. petrop.)
21. *M. MACRORHIZUM* (Royle illustr. t. 61. f. 1), glabrum, radice grossâ, caulibus plurimis adscendentibus, foliis caulinis amplexicaulibus oblongis obtusis sinuato-dentatis, capitulis pedicellatis subcorymbosis, invol. breviter calyculato. \mathcal{L} in Indiâ boreali occid. Cor. cœruleæ. Achæmium brevissimè rostratum. Icon sola prodit. †.
22. *M. LESSERTIANUM*, caule glabro erecto simplici, foliis subintegerrimis lanceolatis, inferioribus basi attenuatis superioribus semiamplexicaulibus, invol. hispido subimbricato. — in Indiâ orient. montanis ad Kamaon et Emodum legit cl. Wallich. *Hieracium Lessertianum* Wall. cat. comp. n. 364. *Sonchi* sp. Frœl. in litt. Certè non *Hieracii* sp. fortè genus proprium Monn. in h. DC. Achænia oblonga compressa striata in rostrum crassum longiusculum producta. (v. s. comm. ab hon. cur. merc. angl. Ind. or.)
- β. *dentatum*, radice tuberosâ, foliis denticulatis, racemo secundo. — in Indiâ or. prov. boreali-occid. legit cl. Royle! Fortè species distincta et cum var. α genus sectionemve constituens. (v. s. comm. à cl. inv.)

DCCCXLV. ANISORAMPHUS.

Capit. multiflorum. Invol. calyculato-imbricatum, squamis lato-linearibus, exter. circ. 2-serialibus brevibus, inter. subbiseriatis elongatis. Recept. epaleaceum. Achænia oblonga (ex immaturo statu) compressa striata rostrata, rostro exteriorum brevi, interiorum longiori. Pappus pilosus multiserialis subochroleucus. — Herba Capensis perennis habitu *Hieracii* aut *Hypochæridis*. Radix crassa cylindracea. Folia radicalia oblonga basi subattenuata subretrorsum dentata glabra, caulina paucissima linearia integerrima. Caulis subnudus basi sulcatus glabrusculus, apice parcè ramosus circ. 3-cephalus pilis rigidis nigris hirtus. Invol. squamæ pilis iisdem confertioribus hirtæ. Flores lutei.

1. *A. HYPOCHÆRIDEUS*. \mathcal{L} ad Cap. Bonæ-Spei, ad Zwart Klipplatrivier et Zwart Key legit cl. Drege! Herba circ. pedalis. (v. s. comm. à cl. inv.)

DCCCXLVI. PICROSIA *Don trans. soc. linn. 16. p. 183. Less. syn. 143.*

Capitulum multiflorum. Invol. 1-seriale 8-phyllum. Recept. nudum. Achænia longè rostrata, imò rostro breviora, fusiformia, longitudinaliter sulcata. Pappus pilosus mollis (?) caducus biserialis scabriusculus inæqualis, cinereo-fulvus ex Don. — Herba Brasiliensis erecta lævigata glauca parcè ramosa. Folia caulina semiamplexicaulia lanceolata integerrima aut vix subdentata. Pedunculi nudi 1-cephali. Flores lutei invol. longiores, ligulæ 4-nerviæ. Pappus in meo specim. fortè non satis adulto albus.

1. *P. LONGIFOLIA* (Don l. c.). \mathcal{L} in Alpibus Peruvix (R. et Pav.), in Brasiliâ (Selow !), in humidis circà Buenos-Ayres et Mendozam (H. et Arn. comp. 1. p. 32). *Troximon fritillarioides* Less. syn. 143. (v. s. comm. à mus. reg. berol.)

DCCCXLVII. TROXIMON *Gærtn. fr. 2. p. 360? Nutt. gen. am. 2. p. 127. Spreng. syst. 3. p. 633. Hook. fl. bor. am. 1. p. 300 non Raf. — Agoseris Raf. fl. ludov. p. 58.*

Capit. multiflorum. Invol. imbricatum subconicum, squamis latis extus plus minus villosiusculis. Recept. epaleaceum. Achænia teretius-