

1. { *Involucri phylla* 7 mm. longa, *caulis basi hirsutissimus*. — Washington, ad Mason City (*Sandberg!*). ***Hieracium candelabrum*** Gdgr.
4. { *Involucri phylla* 10 mm. longa, *caulis basi glaber*. — Wyoming, ad Centennial Valley (*Nelson* n. 4 678!). ***Hieracium Nelsoni*** Gdgr.
1. { *Folia superiora pinnata vel incisa*, *rami patuli pauciflori*, *phylla intima involucri* 8 mm. longa. — America bor., Texas (*Lindheimer* an. 1849-54!) ***Mulgedium Lindheimeri*** Gdgr.
1. { *Folia sup. pinnata*, *rami adscendentes multiflori*, *phylla intima involucri* 11 mm. longa. — Amer. bor., Kansas ad Riley (*Norton* n. 315!) ***Mulgedium polyanthum*** Gdgr.
1. { *Folia sup. integerrima*, *rami uniflori*, *phylla intima* 9,5 mm. longa. — America bor., Illinois ad West Pullman (*Lansing* n. 668!) ***Mulgedium centrale*** Gdgr.

Tres præcedentes, quoad habitum, etc., sat dissimiles, prope *M. floridanum* DC. sunt collocandæ.

Microderis nevadensis Gdgr. — Biennis prorsus papilloso-canescens ad collum araneosa, folia nervosa primatifida fidis lanceolatis valde ciliatis, pedunculi puberuli tubo incrassati, achenia apice tantum hirtella paleis profunde bifidis.

HAB. : California, Nevada ad Reno (*Doten!* *Kennedy!* *Heizer!*).
A *M. linariifolia* Sch. bip. (*Suksdorf* n. 5 583!), etc., differt indumento, foliis magis sectis.

Microderis Forsteri Hook. f. in Oceania multum variat; e sequentibus conjecte :

- | | | |
|------|--|---|
| 1. { | <i>Folia incisa vel subpinnatifida</i> | 2 |
| | <i>Folia integerrima</i> | 5 |
| 2. { | <i>Folia obtusa</i> | 3 |
| | <i>Folia lanceolata</i> | 4 |
| 3. { | <i>Scapus glaber</i> , <i>phylla intima involucri ligulis subbreviora</i> . — Tasmania, Little Plains (<i>Simson</i> n. 527!). | |
| | <i>Microderis obtusifolia</i> Gdgr. | |
| | <i>Scapus pulverulentus</i> , <i>phylla intima involucri ligulis triplo breviora</i> . — Tasmania, ad Sandy Bay (<i>Spicer</i> n. 94! ex parte). | |
| | <i>Microderis tenuicula</i> Gdgr. | |
| 4. { | <i>Calyculus purpureus</i> , <i>folia lata undulata</i> , <i>scapus glaber</i> . — Australia, N. S. Wales ad Tia Falls (<i>Forsyth!</i>). | |
| | <i>Microderis latifolia</i> Gdgr. | |
| | <i>Calyculus viridis</i> , <i>folia angusta plana</i> , <i>scapus fere toto pulverulentus</i> . — Tasmania, ad Kanguroo Point (<i>Spicer</i> n. 94 p. p.!). | |
| | <i>Microderis tasmanica</i> Gdgr. | |
| 5. { | <i>Folia lanceolata nervosa</i> 2/3 sup. <i>scapi glabri æquantia</i> , <i>capitula late cylindrico-ovata</i> . — Australia, Victoria ad Sandringham (<i>Walter!</i>) | |
| | <i>Microderis Walteri</i> Gdgr. | |
| | <i>Folia obtusa vix nervosa</i> 1/3 inf. <i>scapi pulverulentí æquantia</i> , <i>cap. anguste cylindrico-tubulosa</i> . — Nova Zelandia ad Dunderdin (<i>Thomson!</i>) | |
| | <i>Microderis neozelandica</i> Gdgr. | |