

summis ferè linearibus parvis, capitulis racemosis breviter pedicellatis. ♀ in Sibiria Altaica ericetis ad fl. Mœn et Tshuja (Bung!). Sonchus azureus fl. alt. 4. p. 138. ill. ross. alt. t. 496. Cor. cœruleæ. Medium inter hanc et seq. divis. (v. s.)

** *Folius subindivisis dentatis.*

7. *M. RAPUNCULOIDES*, caule erecto simplici glabro apice pubescente racemoso, foliis longè petiolatis cordatis acuminatis dentatis puberulo-subhirsutis, summis sessilibus angustè lanceolatis, racemo subsimplici remotifloro, invol. oblongi squamis exter. ad carinam pilosis cæterum glabris. — in Nepaliæ legit cl. Wallich et anno 1821 specim. misit, sed in ejus catal. non determinare quo. Habitùs ferè Campanulæ. Pappus albus fragilis. Achænia compressa longiusculè rostrata. (v. s.)
8. *M. CYANEUM*, infernè glabrum supernè densissimè glanduloso-pilosum, foliis erosè denticulatis subtus glaucis, infer. ovatis acutis indivisis in petiolum attenuatis, super. oblongis sinuato-lobatis acuminatis sessilibus, capitulis geminis racemosis, invol. pedicello ferè longioribus. ♀ in Nepaliæ montibus excelsis Wall.! Sonchus cyaneus Don fl. nep. 164. Sonch. hastatus Wall.! cat. n. 3250. comp. n. 360 non Less. (v. s. comm. ab hon. cœt. merc. angl. Ind. or.)
9. *M. MULTIFLORUM*, glabrum, caule erecto supernè paniculato subglaucescente, foliis caulinis pinnatipartitis basi cordato-amplexicaulibus, lobis acutis, terninali longiore, racemis plurimis in paniculam dispositis. ♀? (1? ex Desf. Patr. ign. Sonchus racemosus Lam. dict. 3. p. 400. Sonchus multiflorus Desf.! cat. h. par. 1829. p. 145. Differt à *M. Floridanum* foliis non petiolatis.) (v. s. c.)
10. *M. ALBANUM*, glabrum, caule erecto simplici, foliis infer. lyratis, caulinis ovatis acuminatis acutè et grossè dentatis, infer. basi attenuatis, sup. basi cordato-amplexicaulibus, paniculae corymbosaæ pedicellis squamosis. ♀ ad rivulos Caucasi Iberici sub Alpe Schadag (Stev.!) et in Persiâ? (Auch.! n. 3366?). Sonchus Albanus Stev.! mem. soc. mosc. 4. p. 59. Sonchi Sibirici var. Bieb. fl. taur. suppl. n. 1581. Lactuca Albana C. A. Mey.! enum. n. 445. A *M. Sibirico* videtur satis distinctum foliis duplò latioribus multò magis dentatis et patriâ. (v. s.)
11. *M. SIBIRICUM* (Less.! syn. 142), glabrum, caule erecto subsimplici, foliis lanceolatis sessilibus cordato-subamplexicaulibus acuminatis integerrimis dentatis, capitulis paucis racemoso-corymbosis, pedicellis squamosis. ♀ in humi-diusculis Dahuriæ (Turcz.!), Sibiria Altaica (Ledeb.), Lapponia Kemensis (Wickstr.! Less.!) et Tornensis (Wahlenb.), in Finlandiâ (Wahlenb.), in Amer. bor. ad lacum Huron (Hook.). Sonchus Sibiricus Linn. sp. 1118. Ledeb. fl. alt. p. 140. Schkuhr handb. t. 217. — Gmel. fl. sib. 2. p. 11. t. 3. f. A. B. excl. cæt. Amm. Ruth. n. 211. Folia ferè salicina. Invol. squamæ lineares sæpius purpurascentes. Flores cœrulei aut var. albi. Achænia vix rostrata. (v. s.)
fl. indivisum, foliis sinuato-dentatis integerrimis. ♀ circâ Odessam ad Lazaretum (d'Urv.!) in Persiâ ad Guriel (Szow.!). Sonchus Tataricus var. *fl. d'Urv.* enum. p. 99. (v. s.)
12. *M. LÆVIGATUM*, glaberrimum, caule erecto apice paniculato-ramoso, foliis inferioribus petiolatis pinnatipartiti, lobis alternis ovato-triangularibus sulcatis integris, super. angustè lanceolatis pinnatifidis integerrimis, paniculâ ramosissimâ. — in Kawaon Indiæ Orientalis legit cl. Blinkworth! Prænanthes lœvigata Wall.! cat. n. 3269. comp. n. 369 non Blum. Cor. purpureæ. Achænia juniora videntur compressa brevissimè rostrata. Pappus albus. An certè congener? (v. s. comm. ab hon. cœt. merc. angl. Ind. or.)
13. *M. FLORIDANUM*, glabrum, caule erecto supernè paniculato purpuracente aut glaucescente, foliis caul. petiolatis runcinato-pinnatipartiti, lobis paucis sinuato-dentatis, terminali triangulari acuto, paniculâ laxâ erectâ. ♀ in umbrosis et ad margines viarum Amer. bor. à Virginiam ad Carolinam et Floridam. Sonchus Floridanus Linn. sp. 1118. Mulgedium lyratum Cass. dict. 33. p. 297. Sonchus Lapponicus Willd. sp. 3. p. 1520 excl. syn. et patr. ex Spreng. syst.