

3. p. 650. *Lactuca Floridana* Gærtn. et *Sonchus biennis* Mœnch ex Stend. Capitula parva cœrulea. Radix ex Pursh amara alexitera, vulgo ab Anglo-Americanis *Gall of the earth* dicta.
14. *M. ACUMINATUM*, caule erecto glabro simplici, foliis caulinis ovatis acutis in petiolum attenuatis parcè dentatis subtus secus nervos adpressè puberulis, paniculâ thyrsoidéâ glabrâ. (2) in Americâ bor. (Willd.) et in umbrosis à Pensylvaniâ ad Virginiam (Pursh) et in Ludovicâ (Teinturier)! *Sonchus acuminatus* Willd. sp. 3. p. 1521. *Lactuca villosa* Jacq. h. schœnb. 3. t. 367. *Prenanthes sonchoidea* DC. cat. h. monsp. p. 53, sine deser. Cor. pallidè cœruleo-purpurascentes. Capitula inter *Mulgædia parva*. *Canlis rubescens*, *Pappus albus* facile deciduus. (v. v. c. et s. sp.)
15. *M. ROBUSTUM*, caule erecto elato fistuloso glabro apice pedunculisque pilis fuscis conferitis hispido, foliis caulinis elliptico-oblongis utrinque acuminatis-simis dentatis subtus glabris supernè sparsè puberulis, summis linearibus integrerrimis hispidulis, invol. oblongi pauciflori squamis exter. hispidulis, inter. glabris. (2) in Gossain-Than Ind. or. legit cl. Wallich. *Sonchus robustus* Wall. cat. comp. n. 359. Folia infer. lobato-subpinnatisida? Cor. ex sicco videntur purpurascentes? *Pappus albus* fragilis. *Achænia breviter rostrata*. (v. s. comm. ab hon. cur. merc. angl. Ind. or.)
16. *M. SAGITTATUM* (Royle illustr. 1. 61. f. 2), glabrum, caule erecto tereti, foliis caulinis acutè sagittatis lanceolato-linearibus acuminatis integerrinis, paniculâ ramosâ polycephalâ, invol. subimbricato. — in Indiâ bor.-occid. Capitula magna *M. acuminati*. Cor. cœruleæ. *Achænum brevissimè rostratum*. Icon sola prodit. †.
- Sect. II. AGALMA.
- Pappus sordescens*. Invol. calyculatum aut calyculato-imbricatum. Cor. cœruleæ aut purpureæ.
- * *Foliis pinnatilobatis*.
17. *M. LEUCOPHÆUM*, caule erecto glabro apice paniculato, foliis glabris subciliatis runcinatis seu irregulariter pinnatipartitis, lobis grossè dentatis acuminatis, paniculæ ramis racemosis squamosis, invol. glabro. (2) ad margines sylvarum Amer. bor. à Novâ-Angliâ ad Virginiam (Pursh), ad Lacum Huron (Hook.). *Sonchus spicatus* Lam. dict. 3. p. 401, *Sonchus leucophaeus* Willd. sp. 3. p. 1520. *S. Canadensis* olim in hort. par. An fortè *S. Alpinus* Smith ic. ined. t. t. 2? Capitula dimidiò ferè minora quam *M. Alpino*, juniores albi demùm cœrulecentes. Nomen Lamarkii etiamsi vetustius sed falsum omisi. Invol. calyculato-subimbricatum medium inter sect. I. et II. (v. v. c. et s.)
- ** *Foliis indivisis*.
18. *M. CACALIÆFOLIUM*, caule erecto tereti glabro apice hispidissimo, foliis glabris hastato-triangularibus irregulariter dentatis, infer. petiolis foliaceis amplexicanibus donatis, super. sessilibus cordato-sagittatis, floralibus lanceolatis acuminatis hispidis, capitulis corymbosis, invol. subhisrido. (2) in Iberiâ (Stev.), in pratis subalpinis Caucasi ad acidulam Narzanam (Bieb.) et ad montem Beschtau (Mey.!) *Sonchus cacaliæfolius* Bieb. fl. taur. 2. p. 241. suppl. p. 527. Mey. enum. n. 442. Flores cœrulei. *Achænia laevia* vix apice attenuata. *Pappus i-serialis* sordidè flavidus. (v. s.)
19. *M. HISPIDUM*, caule erecto hispido, foliis superioribus ovatis lanceolatis amplexicaulibus, capitulis paniculato-corymbosis, pedunculis subsquamosis involucrisque hispidis. (2) in Sibiræ montibus Werchoturiæ (Gmel.). *Sonchus hispidus* Lebed. fl. alt. 4. p. 140 in adnot. — Gmel. sib. 2. p. 12. n. 12. t. 4. f. 1. Affine *M. cacaliæfolio* dicitur.
20. *M. BASTATUM* (Less. syn. 142), glabrum apice summo pubescens, caule simplici erecto, foliis grossè dentatis acuminatis, infer. hastatis in petiolum attenuatis, super. sessilibus lanceolatis integris, capitulis paniculatis brevissimè pe-