

v. *typicus*: pedunculis involucrisque glandulis stipitatis obsessis. Multo rarius apud nos occurrit.

Hab. (utraque var.) ad margines agrorum, secus vias, ad sepes, in oleraceis et prope domos; in aggeribus, abruptis, in pratis inundatis etc. advena. Per totam ditionem nostram a limite ejus australi usque ad septentrionalem (p. Ust-Unja ad fl. Unja) distributus, in parte australi frequentissimus, in septentrionali rario, sed ubique in locis habitatis frequens.

775. **S. palustris** L. — Ledb. Fl. ross. II, p. 836; Boiss. Fl. or. III, p. 798.

Hab. secus rivulos vel in paludosis inter frutices. In parte australi ditionis rarus.

Distr. Kazan: NO — Arsk (Wirz., Rupr.); SW — Morkwasch!!, Kozlowka (Kryl.); Simb.: S — Jurlowo (Litw.); Samara: M — Sergiëwsk (Claus); Ufa: N — ad fl. Tanyp (Bge); SW — Rajewka, Mekaschewa (Fedcz.); Orenb.: SW — Orenburg (Claus).

776. **Mulgedium tataricum** DC. — Ledb. Fl. ross. II, p. 842; Boiss. Fl. or. III, p. 799.

Hab. praecipue in abruptis vel decliviis apricis arenosis, argillosis vel calcareis, in aggeribus, ruderatis et locis incultis, rarius in oleraceis, prope domos etc. semper advena. In parte australi ditionis sat rarum.

Distr. Kazan: NO — Kazan (in urbe ipsa in decliviis ruderatis!!); SW — Uslon!!, Morkwasch (Mart.); SO — Piczkasy (Rupr.); Simb.: M — Kotiakow!!, distr. Simbirsk (Zing.); S — frequ. sec. Veesenm.; Jurlowo (Litw.), distr. Syzran (Zing.); Samara: M — Sergiëwsk (Claus); W — Tzarewscina!!; S — Soroki (Kryl.); Ufa: SW — Taly-bulak (Litw.), Tiupkildy, Czekady - Tamakowa (Schell), Belebej - Aksakowo (Fedcz.), O — Ochlebinino (Anton.); Orenb.: SW — Gniezdowka!!; Sakmarskij et Orenburg (Schell); SO — Orsk (Schell), Imperotorskaja (Bge); Wiatka: S — prope Pjanyj Bor ad ripam Kamae (Kryl.).

Adnot. **M. tataricum** DC. var. *anomalum* m.: humilis, caule robusto, 15—40 cm. longo, cum foliorum pagina inferiore involucrisque partim floccoso-lanato, foliis magnis runcinnatis, panicula ramis abbreviatis valde condensata, interdum racemiformis. In abruptis argillosis apricis ad ripam Kamae prope Schuran (gub. Kazan: NO) inventum. Specimina multa a me inventa sat conformia, florentia vel deflorata, sed omnia sterilia, quare quasi anomala mihi videntur.

777. **M. sibiricum** Less. — Ledb. Fl. ross. II, p. 843.

Saepissime foliis integerrimis occurrit vel denticulatis, rarius grosse reverse-serratis vel runcinato-pinnatifidis. Folia saepe in eodem specimine diversa.

Hab. in pratis vel silvis inundatis, ad ripas fluviorum inter frutices, ad margines paludum, in depressis humidis inter silvas etc., necnon in arvis vetustis advena. In parte orientali ditionis.