

33:483

composée de squamellules très-nombreuses, inégales, filiformes, extrêmement fines, cassantes, striées, comme articulées, munies de barbellules à peine saillantes. Corolles portant une touffe de longs p^oils très-fins autour du sommet du tube et de la base du limbe.

33:484

Nous ne connoissons qu'une espèce de ce genre.

MYCÉLIDE A FEUILLES ANGULEUSES : *Mycelis angulosa*, H. Cass. ; *Prenanthes muralis*, Linn., *Sp. pl.*, édit. 3, pag. 1121 ; *Chondrilla ruralis*, Gærtn., *De fr. et sem. pl.*, tom. 2, p. 363, tab. 158. Une racine vivace, oblique, épaisse, cylindrique, garnie de fibres descendantes, produit de son sommet une tige dressée verticalement, simple, grêle, cylindrique, finement striée, garnie de feuilles inférieurement, paniculée supérieurement, haute d'environ un pied et demi, glabre comme tout le reste de la plante ; les feuilles sont distantes, alternes, sessiles, embrassantes, minces, membracées, vertes en-dessus, glauques en-dessous ; les inférieures longues de près de six pouces, larges de près de trois pouces, très-profondément lyrées, à partie inférieure étroite, pétioliforme, dentée, élargie à la base, qui est échancrée en cœur ; la division terminale est très-grande, profondément échancrée à sa base, découpée à peu près en trois lobes, qui sont eux-mêmes découpés sur les bords par des sinus plus ou moins profonds, formant quelques angles saillans, inégaux, mais très-symétriques, terminés chacun par une petite dent ; les divisions latérales de la feuille, ordinairement au nombre de quatre, sont dirigées obliquement en arrière, d'une figure irrégulière, à bords anguleux ; les feuilles supérieures sont graduellement plus petites et moins divisées ; les calathides ne sont point pendantes ou penchées, comme celles des *Prenanthes* ; elles sont nombreuses, et disposées en une panicule terminale, divariquée, à ramifications longues, grêles, accompagnées de bractées foliacées, inégales ; le péricline est étroit, long de cinq lignes ; les corolles sont jaunes. Cette plante habite les environs de Paris, où on la trouve dans les lieux ombragés, et où elle fleurit entre les mois de Juin et de Septembre. La plupart des auteurs la disent annuelle : mais nous pensons, comme Smith (*Fl. brit.*, p. 821), qu'elle est réellement vivace, parce que la tige de l'indi-

vidu sur lequel nous avons fait la description qu'on vient de lire, naissoit de l'extrémité d'une souche rampant obliquement dans le sein de la terre, et garnie de racines.

33:484

La *Mycélide*, associée aux *Prenanthes* par Linné, et aux *Chondrilla* par Lamarek, Gærtner, Mœnch, De Candolle, n'appartient certainement ni à l'un ni à l'autre de ces deux genres. En effet, l'existence d'un col très-manifeste et très-distinct sur le sommet du fruit l'exclut évidemment du genre *Prenanthes*, comme on l'a déjà reconnu avant nous; et elle n'est pas mieux placée dans le genre *Chondrilla*, qui a pour type la *Chondrilla juncea*, dont le fruit n'est point du tout aplati, mais obovoïde-oblong, hérissé au sommet d'excroissances laminées fort remarquables, imitant un calice, et surmonté d'un long col.

33:485

Notre genre *Mycelis*, solidement fixé parmi les Lactucées-Prototypes, par ses fruits aplatis et par ses rapports naturels, se distingue de tous les autres genres de cette section par son péricline de squames unisériées, entouré à la base de squamules surnuméraires; et il est très-convenablement placé entre le genre *Lactuca*, auquel il ressemble par ses fruits, mais dont il diffère par son péricline, et le genre *Lampsana* commençant la série de nos Lactucées-Crépidées, auxquelles il ressemble par le péricline, mais dont il diffère par les fruits. Ainsi le *Mycelis* terminera fort bien notre première section, dont nous excluons désormais les *Chondrilla* et *Prenanthes*, que nous y avions rangés mal à propos, puisque leurs fruits ne sont ni aplatis ni tétragones. (Voyez tom. XXV, pag. 60 et 61.)

Le genre *Prenanthes* sera transféré parmi les Lactucées-Hiéraciées, pour des motifs que nous ferons connoître dans l'article NABALUS. Le genre *Chondrilla* fera partie des Lactucées-Crépidées et commencera la série des Crépidées à aigrette barbellulée, en sorte qu'il se trouvera placé entre le *Koelpinia* et le *Zacintha*. (Voyez tom. XXV, pag. 61 et 62.) Ce genre *Chondrilla*, ayant pour type la *Chondrilla juncea*, présente les caractères suivans.

CHONDRILLA. Calathide incouronnée, radiatiforme, pauciflore (huit ou dix), fissiflore, androgyniflore. Péricline inférieur aux fleurs, cylindracé, formé de huit squames