

- β. lævis*, caule foliisque lævibus glabris. \mathcal{U} in Terrâ-Novâ legit cl. Lapy-
laie. Capitula paulò breviora quàm in ic. Pursh. Pappus stramineus. (v. s.)
2. *N. ALTISSIMUS* (Hook. fl. bor. am. i. p. 294), caule erecto ramoso glabro, fo-
liis trilobis petiolatis angulatis denticulatis margine scabris, racemis axillaribus
in paniculam laxam dispositis, invol. cylindricis 5-phyllis 5-floris. \mathcal{U} in mon-
tibus Carolinæ (Ell.), in sylvis umbrosis à Canadâ ad Virginiam (Pursh), in
Terrâ-Novâ (Hook). Prenanthes altissima Linn. sp. 1121. Willd. sp. 3. p. 1537.
Ell. sketch 2. p. 256. Harpalyce altissima Beck bot. p. 167. Chondrilla altis-
sima Lam. dict. 2. p. 78. — Pluk. alm. t. 317. f. 2. Flores flavi. Caulis 4-8-
pedalis.
3. *N. TRILOBATUS* (Cass. dict. 34. p. 96), glaber, caule erecto ramoso tereti, fo-
liis infer. petiolatis tripartitis in petiolum decurrentibus, lobis ovatis acutis me-
dio utrinque lateralibus acutè lobulatis, summis ovali-oblongis basi subat-
tenuatis integerrimis, racemis confertis in paniculam brevem digestis, invol.
cylindrico 8-phyllis 10-11-floro glaberrimo. \mathcal{U} in Amer. bor. Olim cultam in
hort. Pitcairn. legit cl. L'Héritier. Pappus stramineus. Cor. albidæ. Radix rama-
rosa nec tuberosa. Herba pedalis. Folia subtus pallida. (v. s.)
4. *N. FRASERI*, caule erecto ramoso sparse pubescente, foliis caulinis trifidis den-
ticulatis subciliatis in petiolum decurrentibus, infer. cordatis, super. basi car-
neatis, supremis oblongis inciso-dentatis, racemis confertis in paniculam dis-
positis, invol. cylindricis 8-phyllis sparse puberulis 8-floris. \mathcal{U} in Carolinâ
meridionali olim legit cl. Fraser. Prenanthes alba Ell. sketch 2. p. 259 non
Linn. nec Sims nec Salisb. Pren. rubicunda Willd. sp. 3. p. 1537? Nab. trifo-
liatus Cass. dict. 34. p. 95? Pappus stramineus nec ut in *N. suavi rufus*. Flores
ochroleuco-albi. Radix ex Ell. tuberosa amarissima, undè Fel terræ (*Gall of earth*
angl.) dicitur. (v. s. sine rad.)
5. *N. NANUS*, glaber, caule erecto tereti simplici, foliis radic. caulinis petiolatis
tripartitis, lobis lanceolatis acuminatis subintegerrimis, paniculâ contractâ ra-
cemosâ, invol. cylindricis 8-phyllis 10-12-floris, squamis apice ciliatis. \mathcal{U} in
Amer. bor. montibus albis (Big. Torr.). Prenanthes alba β nana Big. fl. host.
ed. 2. p. 286. *P. nana* Tor. in litt. 1824. Harpalyce alba β Beck. bot. p. 167.
Herba 8-pollic. Folia ex Big. formâ varia. Pappus stramineus longit. involucri
æqualis. Calyculi squamæ breves acutæ. (v. s. comm. à cl. Torrey.)
- ** *Foliis dentatis angulatis pinnatifidisve.*
6. *N. GLAUCUS*, caule ramoso striato glauco, foliis sinuato-pinnatifidis obtusè
dentatis glaucis suprâ scabris, foliolis calyculi filiformibus. — in Louisiana.
Prenanthes glauca Raf. fl. lud. 57. Esopon glaucum Raf. fl. lud. 149. *Chicorée*
usuelle Rob. louis. p. 424. Affinis dicitur *N. serpentario*, sed flores flavi. Invol.
polyphyllum. †
7. *N. SUAVIS*, glaber, caule tereti striato ramoso, foliis acutè angulatis subhastatis
in petiolum attenuatis, racemis brevibus in paniculam dispositis, capitulis nu-
tantibus, invol. cylindricis 8-phyllis coloratis lævibus 8-10-floris. \mathcal{U} in locis
siccis Carolinæ (Ell.), Novæ-Angliæ (Pluk.), Virginie (Clayt.). Prenanthes
alba Linn. sp. 1121? Sims bot. mag. t. 1079. Ell. sketch 2. p. 259 non Big.
nec Ell. Prenanthes suavis Salisb. par. t. 85. opt. Chondrilla alba Lam. dict. 2.
p. 79. Nab. albus Hook. fl. bor. am. i. p. 294. Rami et invol. rubentia. Cor.
albæ. Achænia flavida. Pappus cinnamomeus. (v. s.)
8. *N. ALATUS* (Hook. fl. bor. am. i. p. 294. t. 102), caule simplici erecto gla-
bro, foliis longè petiolatis deltoideis acutissimis sinuato-dentatis, petiolis alatis,
paniculâ laxâ parvâ, capitulis nutantibus, foliis supremis pedicellis involucri-
que pubescenti-hirsutis. (1) ad Fort-Vancouver et in insula Observatory in
Americæ boreali-occidentalis littore. Flores albi? ut in *N. suavi* cui valdè affinis.
9. *N. BOOTII*, caule erecto simplici apice pedicellisque subhirsutis, foliis glabris
integerrimis, radicalibus petiolatis obtusis cordatis, mediis cordato-lanceolatis
in petiolum attenuatis, summis lineari-lanceolatis acuminatis, racemo terminali

simplici, capituli 8-10-flori squamis 8 apice ciliatis, cæterum glaberrimis. \mathcal{L} in Amer. bor. montibus albis, supra sylvarum regionem stat. New-Hampshire legit cl. Boot! Herba semi-pedalis. Cor. pallidæ. Pappus stramineus. An var. *N. nani*? (v. s. comm. à cl. inv.)

10. *N. CORDATUS* (Hook. fl. bor. am. 1. p. 294), glaber, caule elato rubicundo apice laxè paniculato, foliis infer. petiolatis cordatis dentatis, mediis breviter petiolatis lanceolatis sinuato-dentatis, summis subsessilibus integerrimis, racemis 4-5-cephalis ad apices ramorum nutantibus, invol. cylindricis 8-phyllis 8-10-floris. \mathcal{L} in Amer. bor., in Canadâ (Hook.), circâ Boston (Big.), in Noveboraco et Virginiâ (Pursh), in Carolinæ montanis (Ell.). *Prenanthes alba* Big. in litt. 1817. (sed vix fl. bost. descr. respondit.) *Prenanthes cordata* Willd. hort. ber. t. 25. Ell. sketch 2. p. 257. Pursh fl. 2. p. 499. Cor. pallidè ochroleucæ. (v. s.)
11. *N. DELTOIDEUS*, caule simplici glabro, foliis longè petiolatis deltoideis acuminatis acutè denticulatis glabris subtùs subglaucis, racemis axillaribus oligocephalis, invol. 5-phyllis 5-floris, \mathcal{L} in Amer. bor. ad montes Saluda. *Prenanthes deltoidea* Ell. sketch 2. p. 257 non Bieb. Cor. purpureæ?
12. *N. CREPIDINEUS*, caule angulato ramoso, foliis ovato-lanceolatis in petiolum attenuatis inæqualiter angulato-dentatis glabris, paniculæ fasciulis oligocephalis nutantibus, invol. hispidis 10-12-phyllis sub-20-floris. \mathcal{L} in agro Illinoensium et excelsis montibus Carolinæ (Michx.), in Kentucky (Raf.). *Prenanthes crepidinea* Michx. fl. bor. am. 2. p. 84. Pursh fl. 2. p. 499. *Prenanthes gigantea* Raf. in litt. 1831. *Hieracium crepidineum* Fœrl. mss. Cor. flavidæ. Pappus stramineus. An *Pr. crepidinea* Ell. sketch 2. p. 259, de quâ dicitur invol. glabriusculum, omninò eadem? (v. s. comm. à cl. Raf.)

*** *Foliis subintegerrimis.*

13. *N. VIRGATUS*, glaber, caule simplissimo, foliis angustè lanceolatis, infer. sinuatis dentatisve, super. integerrimis, racemo terminali subsimplici, capitulis 1-3 fasciculatis pedicellatis 8-10-floris, invol. lævi 8-phyll. \mathcal{L} in pinetis humidis Carolinæ (Mich. Fras. Bosc.), et Georgiæ (Ell.). *Prenanthes virgata* Michx. fl. 2. p. 83. *Pren. virgata* et *P. simplex* Pursh fl. 2. p. 498. Ell. sketch 2. p. 258. *Harpalyce virgata* Beck bot. p. 167. *Prenanthes autumnalis* Walt. et *Sonchus virgatus* Desf. ex Steud. Cor. pallidè purpureæ. Pappus stramineus. (v. s.)
14. *N. INTEGRIFOLIUS* (Cass. dict. 34. p. 96), glaber, foliis caulinis ellipticis acutis integris aut subdenticulatis in petiolum brevem attenuatis, racemis brevibus in paniculam coarctatam dispositis, invol. cylindricis 8-phyllis 8-10-floris. \mathcal{L} in Amer. bor. An *Prenanthes alba* quorundam, olim culta in hort. Paris? Pappus pallidè rufescens. (v. s. c.)
15. *N. RACEMOSUS* (Hook. fl. bor. am. 1. p. 294), glaber, caule simplici, foliis omnibus indivisis lævibus, radicalibus ovato-lanceolatis, caulinis semiamplexicaulibus, racemis lateralibus fasciculatis in paniculam racemiformem dispositis, invol. hirsutissimo 8-phyll. 9-12-floro. \mathcal{L} in Canadâ boreali. *Prenanthes racemosa* Michx. fl. bor. am. 2. p. 84 non Roxb. *Harpalyce racemosa* Beck bot. 168. Pappus stramineus. (v. s.)
16. *N. ILLINOENSIS*, caule simplici foliisque asperrimis, foliis omnibus indivisis ovali-lanceolatis, racemo elongato hirsuto, fasciulis capitulorum subsessilibus erectis. \mathcal{L} in pratis regionis Illinoensium. *Prenanthes aspera* Michx. fl. bor. am. 2. p. 83 non Schrad. *Pren. Illinoensis* Pers. ench. n. 14. Pursh fl. 2. p. 200. *Chondrilla Illinoensis* Poir. suppl. 2. p. 331.

DCCCXLI. REA Bertero herb. 1830! *Decaisne* in Guill arch. bot. 1. p. 509. — *Dendroseris* Don phil. mag. 1832. apr. ex Hook. et Arn. comp. 1. p. 32.

Capitulum multiflorum. Invol. imbricatum. Recept. concavum seu planum, epaleaceum, alveolatum, marginibus subfimbrilliferis. Achænia