

simplici, capituli 8-10-flori squamis 8 apice ciliatis, cæterum glaberrimis. \mathcal{L} in Amer. bor. montibus albis, supra sylvarum regionem stat. New-Hampshire legit cl. Boot! Herba semi-pedalis. Cor. pallidæ. Pappus stramineus. An var. N. nani? (v. s. comm. à cl. inv.)

10. *N. CORDATUS* (Hook. fl. bor. am. 1. p. 294), glaber, caule elato rubicundo apice laxè paniculato, foliis infer. petiolatis cordatis dentatis, mediis breviter petiolatis lanceolatis sinuato-dentatis, summis subsessilibus integerrimis, racemis 4-5-cephalis ad apices ramorum nutantibus, invol. cylindricis 8-phylis 8-10-floris. \mathcal{L} in Amer. bor., in Canadâ (Hook.), circâ Boston (Big.!), in Noveboraco et Virginiam (Pursh), in Carolinæ montanis (Ell.). *Prenanthes alba* Big.! in litt. 1817. (sed vix fl. bost. descr. respondit.) *Prenanthes cordata* Willd. hort. ber. t. 25. Ell. sketch 2. p. 257. Pursh fl. 2. p. 499. Cor. pallidè ochroleucæ. (v. s.)

11. *N. DELTOIDEUS*, caule simplici glabro, foliis longè petiolatis deltoideis acuminatis acutè denticulatis glabris subtus subglaucis, racemis axillaribus oligocephalis, invol. 5-phylis 5-floris. \mathcal{L} in Amer. bor. ad montes Saluda. *Prenanthes deltoidea* Ell. sketch 2. p. 257 non Bieb. Cor. purpureæ?

12. *N. CREPIDINEUS*, caule angulato ramoso, foliis ovato-lanceolatis in petiolum attenuatis inæqualiter angulato-dentatis glabris, paniculæ fasciculis oligocephalis nutantibus, invol. hispidis 10-12-phylis sub-20-floris. \mathcal{L} in agro Illinoensium et excelsis montibus Carolinæ (Michx.), in Kentucky (Raf.!). *Prenanthes crepidinea* Michx. fl. bor. am. 2. p. 84. Pursh fl. 2. p. 499. *Prenanthes gigantea* Raf.! in litt. 1831. *Hieracium crepidineum* Frœl. mss. Cor. flavidæ. Pappus stramineus. An *Pr. crepidinea* Ell. sketch 2. p. 259, de quâ dicitur invol. glabriuscum, omnino eadem? (v. s. comm. à cl. Raf.)

*** *Foliis subintegerrimis.*

13. *N. VIRGATUS*, glaber, caule simplissimo, foliis angustè lanceolatis, infer. sinuatis dentatisve, super. integerrimis, racemo terminali subsimplici, capitulis 1-3 fasciculatis pedicellatis 8-10-floris, invol. laevi 8-phyllo. \mathcal{L} in pinetis humidis Carolinæ (Mich. Fras.! Bosc!), et Georgiæ (Ell.). *Prenanthes virgata* Michx. fl. 2. p. 83. *Pren. virgata* et *P. simplex* Pursh fl. 2. p. 498. Ell. sketch 2. p. 258. *Harpalyce virgata* Beck bot. p. 167. *Prenanthes autumnalis* Walt. et *Sonchus virgatus* Desf. ex Steud. Cor. pallidè purpureæ. Pappus stramineus. (v. s.)

14. *N. INTEGRIFOLIUS* (Cass. dict. 34. p. 96), glaber, foliis caulinis ellipticis acutis integris aut subdenticulatis in petiolum brevem attenuatis, racemis brevibus in paniculam coarctatam dispositis, invol. cylindricis 8-phylis 8-10-floris. \mathcal{L} in Amer. bor. An *Prenanthes alba* quorundam, olim culta in hort. Paris.? Pappus pallidè rufescens. (v. s. c.)

15. *N. RACEMOSUS* (Hook. fl. bor. am. 1. p. 294), glaber, caule simplici, foliis omnibus indivisis laevis, radicalibus ovato-lanceolatis, caulinis semiamplexicaulibus, racemis lateralibus fasciculatis in paniculam racemiformem dispositis, invol. hirsutissimo 8-phyllo 9-12-floro. \mathcal{L} in Canadâ boreali. *Prenanthes racemosa* Michx. fl. bor. am. 2. p. 84 non Roxb. *Harpalyce racemosa* Beck bot. 168. Pappus stramineus. (v. s.)

16. *N. ILLINOENSIS*, caule simplici foliisque asperimis, foliis omnibus indivisis ovali-lanceolatis, racemo elongato hirsuto, fasciculis capitulorum subsessilibus erectis. \mathcal{L} in pratis regionis Illinoensiæ. *Prenanthes aspera* Michx. fl. bor. am. 2. p. 83 non Schrad. *Pren. Illinoensis* Pers. enc. n. 14. Pursh fl. 2. p. 200. *Chondrilla Illinoensis* Poir. suppl. 2. p. 331.

DCCCXLII. REA Bertero herb. 1830! *Decaisne in Guill arch. bot.* 1. p. 509.—
Dendroseris Don phil. mag. 1832. apr. ex Hook. et Arn. comp. 1. p. 32.

Capitulum multiflorum. Invol. imbricatum. Recept. concavum seu planum, epaleaceum, alveolatum, marginibus subfimbrilliferis. Achænia