

cules garnis de petites écailles; le péricline, formé de huit squames, est glabre, lisse, vert inférieurement, rougeâtre supérieurement; les corolles sont blanches, un peu rosées. Nous avons observé cette plante au Jardin du Roi, où elle n'étoit point nommée, et où elle fleurissoit vers le milieu d'Août. Ce ne peut pas être le *prenanthes rubicunda* de Willdenow; cependant nous présumons que c'est le *prenanthes alba*, var.  $\beta$ , de Linné, parce que la phrase de Gronovius, citée par Linné, paroît se rapporter assez bien à notre plante.

NABALE A FEUILLES ENTIÈRES : *Nabalus integrifolius*, H. Cass.; An? *Prenanthes alba*, Linn., pag. 1121. Celle-ci diffère essentiellement des deux précédentes, en ce que ses feuilles ont le pétiole simple, non bordé, et le limbe subsagitté, entier, sinué-denté. Nous l'avons vue au Jardin du Roi, où elle fleurissoit vers la fin d'Août: elle n'étoit point nommée; mais nous pensons que ce doit être le vrai *prenanthes alba*.

Les trois espèces que nous venons de signaler, habitent probablement l'Amérique septentrionale. Elles constituent, selon nous, un genre différent du véritable *prenanthes*, ayant pour type le *prenanthes purpurea*, qui nous a offert les caractères génériques suivans :

PRENANTHES. Calathide pendante, incouronnée, radiatiforme, unisériée, tri-quadriflore, fissiflore, androgyniflore. Péricline inférieur aux fleurs, cylindracé-campanulé, formé de quatre ou cinq squames subunisériées, se recouvrant par les bords, égales, appliquées, oblongues, obtuses au sommet, subfoliacées, épaisses et charnues à la base, un peu carénées sur le dos, un peu membraneuses sur les bords; la base du péricline entourée d'environ cinq squamules surnuméraires très-inégales, subunisériées, ou plurisériées et comme imbriquées, appliquées, ovales, obtuses. Clinanthe très-petit, plan, nu. Ovaires pédicellulés, oblongs, courts, épais, subovoïdes, subcylindracés ou subpentagones, glabres, lisses, un peu amincis vers la base, tronqués au sommet, sans col ni bourçlet, apiculaire distinct; aigrette longue, blanche, composée de squamellules nombreuses, inégales, filiformes, assez fortes, roides, très-barbellulées. Corolles pourpres, ayant le sommet du tube élargi et entouré de