

понижающие или прямостоячие; венчики пурпурные или желтые. Короткокорневищные многолетники.

Лектотипус (Cassini, 1825 : 96, «type»; Sennikov, h. l.): *P. purpurea* L.

3 вида в 3 секциях (Сенников, 1997): *P. purpurea*, *P. petiolata* (C. Koch) Sennik. и *P. abietina* (Boiss. et Bal.) Kirp. Распространен в горах Средн. и Южн. Европы, на Кавказе и в Малой Азии.

Род 2. *Notoseris* C. Shih, 1987, Acta Phytotax. Sin. 25, 3 : 196.

Семянки с 10–20 слабо выраженными ребрами. Щетинки паппуса кремово-белые. Корзинки с 3–5 пурпурными цветками, поникающие; венчики пурпурные; рыльца далеко выдаются из венчика. Короткокорневищные многолетники.

Т у р у s: *N. psilolepis* C. Shih.

14 близкородственных видов (Shih, 1987, 1997) в южных и юго-восточных районах Китая.

Род 3. *Nabalus* Cass. 1825, in Cuvier, Dict. Sci. Nat. 34 : 94.

Семянки с 10–20 слабо выраженными ребрами или почти гладкие. Щетинки паппуса желтоватые или рыжеватые. Корзинки с 5–30 цветками, поникающие или прямостоячие; венчики белые, желтые или пурпурные. Двулетники со стержневым корнем.

Лектотипус (Sennikov, h. l.): *N. trifolius* Cass. (= *N. albus* (L.) Hook.).

Около 18 видов в России (Дальний Восток), Китае, Японии и Сев. Америке.

Примечание. Предложенный ранее Пфайффером (Pfeiffer, 1874 : 404) лектотип рода *Nabalus* (*Prenanthes alba* L.) не может быть принят, так как тип названия этого вида не был включен в протокол названия рода *Nabalus*.

Секция 1. *Nabalus*. — Inflorescentia generalis laxa, paniculata. Calathidia 10–20-flora, patentia, floribus luteis. Styli longe exserti, ramis brevibus (1.5–2 mm lg.), spinulis brevibus instructi. Folia caulina media inferioraque ovata vel oblongo-ovata, petiolata.

Т у р у s: generis lectotypus.

Общее соцветие рыхлое, метельчатое. Корзинки с 10–20 желтыми цветками, поникающие. Столбики далеко выдающиеся из трубки венчика, с короткими (1.5–2 мм дл.) ветвями, покрытые короткими шипиками. Средние и нижние листья яйцевидные или продолговатояйцевидные, черешковые.

Т и п: лектотип рода.

Виды: *N. albus* (L.) Hook., *N. crepidineus* (Michx.) Hook., *N. fraseri* DC., *N. serpentarius* Pursh.

Секция 2. *Racemosi* Sennik. sect. nova. — Inflorescentia generalis compacta, racemosa. Calathidia 20–25-flora, patentia, floribus roseololuteis. Styli longe exserti, ramis brevibus (1.5–2 mm lg.), spinulis brevibus

instructi. Folia caulina media inferioraque oblonga, basi attenuata, late amplexicaulia.

Т у р у s: *N. racemosus* (Michx.) Hook.

Sectio monotypica.

Общее соцветие компактное, кистевидное. Корзинки с 20–25 розовато-желтыми цветками, поникающие. Столбики далеко выдающиеся из трубки венчика, с короткими (1.5–2 мм дл.) ветвями, покрытые короткими шипиками. Средние и нижние листья продолговатые, к основанию суженные, сидячие, широко стеблеобъемлющие.

Т и п: *N. racemosus* (Michx.) Hook.

Монотипная секция.

Секция 3. **Ochroleuci** Sennik. sect. nova. — Inflorescentia generalis laxa, paniculata. Calathidia (15) 20–30-flora, patentia vel erecta, floribus ochroleucis. Styli corollae subaequales, ramis longis (2–2.5 mm lg.), spinulis brevibus instructi. Folia caulina media inferioraque triangulari-ovata, petiolata.

Т у р у s: *N. ochroleucus* Maxim.

Общее соцветие рыхлое, метельчатое. Корзинки с (15) 20–30 желтыми цветками, поникающие или прямостоячие. Столбики примерно равные венчику, с длинными (2–2.5 мм дл.) ветвями, покрытые короткими шипиками. Средние и нижние листья треугольно-яйцевидные, черешковые.

Т и п: *N. ochroleucus* Maxim.

Виды: *N. boottii* DC. (= *N. sagittatus* (A. Gray) Rydb.), *N. hastatus* (Less.) A. A. Heller (= *N. alatus* Hook.), *N. ochroleucus*.

Секция 4. **Asperi** Sennik. sect. nova. — Inflorescentia generalis compacta, racemosa. Calathidia (15) 20–30-flora, erecta, floribus luteis. Styli corollae subaequales, ramis longis (2–2.5 mm lg.), spinulis brevibus instructi. Folia caulina media inferioraque oblonga vel oblongo-lanceolata, sessilia.

Т у р у s: *N. asper* (Michx.) Torr. et A. Gray.

Sectio monotypica.

Общее соцветие компактное, кистевидное. Корзинки с (15) 20–30 желтыми цветками, прямостоячие. Столбики примерно равные венчику, с длинными (2–2.5 мм дл.) ветвями, покрытые короткими шипиками. Средние и нижние листья продолговатые или продолговато-ланцетные, сидячие.

Т и п: *N. asper* (Michx.) Torr. et A. Gray.

Монотипная секция.

Секция 5. **Altissimi** Sennik. sect. nova. — Inflorescentia generalis laxa, paniculata. Calathidia 5–10-flora, patentia, floribus purpureis. Styli longe exserti, ramis brevibus (1.5–2 mm lg.), spinulis longis instructi. Folia caulina media inferioraque ovata, petiolata.

Т у р у s: *N. altissimus* (L.) Hook.

Sectio monotypica.