

- H. PILOSUM* Willd. = *Picris Pyrenaica*.
H. PINNATIFIDUM Willd. = *Crepis pinnatifida*.
H. PRÆMORSUM Linn. = *Crepis præmorsa*.
H. PRUNELLÆFOLIUM Gon. = *Crepis pygmæa*.
H. PULCHRUM Frœl. = *Crepis pulchra*.
H. PUMILUM Ten. = *Crepis Columnæ*.
H. PURPUREUM Willd. = *Intybellia purpurea*.
H. PYGMÆUM Lam. = *Crepis pygmæa*.
H. PYRENAICUM Roch. = *Crepis blattarioides*.
H. RHÆADIFOLIUM Fisch. = *Barkhausia rhæadifolia*.
H. SANCTUM Linn. = *Pterotheca Nemausensis*.
H. SIBIRICUM Willd. = *Crepis Sibirica*.
H. SIMPLEX Viv. = *Crepis simplex*.
H. SPINULOSUM Spreng. = *Sonchus arvensis*.
H. SPRENGERIANUM Linn. = *Picris pauciflora*.
H. STIPITATUM Jacq. = *Willemetia apargioides*.
H. STOLONIFERUM Viv. = *Ætheorhiza bulbosa*.
H. STRICTUM Ledeb. = *Crepis Bungei*.
H. STUPPEUM Reich. = *Crepis heterogyna*.
H. SUCCISÆFOLIUM All. = *Crepis succisæfolia*.
H. TARAXACI Linn. = *Apargia Taraxaci*.
H. THOMASINII Host. = *Crepis heterogyna*.
H. TINGITANUM Salzm. = *Barkhausia Tingitana*.
H. TUBEROSUM Balb. = *Leontodon tuberosum*.
H. VARIEGATUM Lam. = *Leontodon variegatum*.
H. VILLARSII Vill. = *Leontodon Villarsii*.
H. ULIGINOSUM Turcz. = *Crepis Bungei*.

DCCCXL. *NABALUS* Cass. dict. 34 (1825). p. 94. 69. p. 590. Hook. fl. bor. am. 1. p. 293. — *Harpalyce Don new edinb. phil. journ.* 1829. et in *linnæa* 1830. litt. p. 140 non DC. 1825. — *Esopon Raf. fl. lud.* 1817. p. 146. — *Prenanthis* sp. Linn.

Capit. 5-20-florum. Invol. 8-10-phyllum, squamis accessoriis calyculatum. Recept. nudum. Styli extrâ antherarum vaginam longè exserti. Achænia oblonga subcylindracea sulcata glabra apice truncata. Pappus pluriserialis, setis rigidulis fragilibus coloratis scabris. — *Herbæ erectæ boreali-Americanæ perennes*. Folia radic. et caulina sæpius diversa. Capitula racemosa aut paniculata nutantia. Cor. albæ purpureæ aut ochroleucæ. Radices sæpè tuberosæ gustu amaræ. — *Species dicuntur polymorphæ nec satis ritè distinctæ*. — *Nomen omninò sensûs expers fortè mutandum*.

* *Foliis palmato-seu trifidè lobatis.*

x. *N. SERPENTARIUS* (Hook. fl. bor. am. 1. p. 294), foliis dentatis asperis radicalibus palmato-sinuatis, caulinis longè petiolatis sinuato pinnatifidis subtrilobis, lobo intermedio tripartito, summis lanceolatis, racemis terminalibus subpaniculatis brevibus nutantibus, invol. 8-phyllis 12-floris. ♀ in montibus Virginiae, Carolinae (Pursh.), Pennsylvaniae (Doerl.), Noveboracæ (Beck.), Marylandiæ (Bart.), in Canadâ et ad lacum Hudson (Hook.). *Prenanthes serpentaria* Pursh fl. bor. am. 2. p. 499. t. 14. *Harpalyce serpentaria* Don l. c. Beck bot. p. 167. Cor. pallidè purpureæ. Præstans specificum adversus morsus serpentum ex Pursh.

β. lævis, caule folisque lævibus glabris. \mathcal{L} in Terrâ-Novâ legit cl. Lapy-laiæ. Capitula paulò breviora quàm in ic. Pursh. Pappus stramineus. (v. s.)

2. N. ALTISSIMUS (Hook. fl. bor. am. 1. p. 294), caule erecto ramoso glabro, foliis trilobis petiolatis angulatis denticulatis margine scabris, racemis axillaribus in paniculam laxam dispositis, invol. cylindricis 5-phyllis 5-floris. \mathcal{L} in montibus Carolinæ (Ell.), in sylvis umbrosis à Canadâ ad Virginiam (Pursh), in Terrâ-Novâ (Hook). Prenanthes altissima Linn. sp. 1121. Willd. sp. 3. p. 1537. Ell. sketch 2. p. 256. Harpalyce altissima Beck bot. p. 167. Chondrilla altissima Lam. dict. 2. p. 78. — Pluk. alm. t. 317. f. 2. Flores flavi. Caulis 4-8-pedalis.
3. N. TRILOBATUS (Cass. dict. 34. p. 96), glaber, caule erecto ramoso tereti, foliis infer. petiolatis tripartitis in petiolum decurrentibus, lobis ovatis acutis medio utrinque lateralibus acutè lobulatis, summis ovali-oblongis basi subattenuatis integerrimis, racemis confertis in paniculam brevem digestis, invol. cylindrico 8-phylo 10-11-floro glaberrimo. \mathcal{L} in Amer. bor. Olim cultam in hort. Pitcairn. legit cl. L'Héritier. Pappus stramineus. Cor. albidæ. Radix ramosa nec tuberosa. Herba pedalis. Folia subtùs pallida. (v. s.)
4. N. FRASERI, caule erecto ramoso sparsè pubescente, foliis caulinis trifidis denticulatis subciliatis in petiolum decurrentibus, infer. cordatis, super. basi cuneatis, supremis oblongis inciso-dentatis, racemis confertis in paniculam dispositis, invol. cylindricis 8-phyllis sparsè puberulis 8-floris. \mathcal{L} in Carolinâ meridionali olim legit cl. Fraser. Prenanthes alba Ell. sketch 2. p. 259 non Linn.? nec Sims nec Salisb. Pren. rubicunda Willd. sp. 3. p. 1537? Nab. trifoliatus Cass. dict. 34. p. 95? Pappus stramineus nec ut in N. suavi rufus. Flores ochroleuco-albi. Radix ex Ell. tuberosa amarissima, undè Fel terræ (*Gall of earth* angl.) dicitur. (v. s. sine rad.)
5. N. NANUS, glaber, caule erecto tereti simplici, foliis radic. caulinis petiolatis tripartitis, lobis lanceolatis acuminatis subintegerrimis, paniculâ contractâ racemosâ, invol. cylindricis 8-phyllis 10-12-floris, squamis apice ciliatis. \mathcal{L} in Amer. bor. montibus albis (Big. Torr.!). Prenanthes alba β nana Big. fl. hyst. ed. 2. p. 286. P. nana Tor. in litt. 1824. Harpalyce alba β Beck. bot. p. 167. Herba 8-pollic. Folia ex Big. formâ varia. Pappus stramineus longit. involucri æqualis. Calyculi squamæ breves acutæ. (v. s. comm. à cl. Torrey.)

** *Foliis dentatis angulatis pinnatifidisve.*

6. N. GLAUCUS, caule ramoso striato glauco, foliis sinuato-pinnatifidis obtusè dentatis glaucis suprâ scabris, foliolis calyculi filiformibus. — in Louisiana. Prenanthes glauca Raf. fl. lud. 57. Esopon glaucum Raf. fl. lud. 149. *Chicorée usuelle* Rob. louis. p. 424. Affinis dicitur N. serpentario, sed flores flavi. Invol. polyphyllum. †.
7. N. SUAVIS, glaber, caule tereti striato ramoso, foliis acutè angulatis subhastatis in petiolum attenuatis, racemis brevibus in paniculam dispositis, capitulis nutantibus, invol. cylindricis 8-phyllis coloratis lævibus 8-10-floris. \mathcal{L} in locis siccis Carolinæ (Ell.), Novæ-Angliæ (Pluk.), Virginie (Clayt.). Prenanthes alba Linn. sp. 1121? Sims bot. mag. t. 1079. Ell. sketch 2. p. 259 non Big. nec Ell. Prenanthes suavis Salisb. par. t. 85. opt. Chondrilla alba Lam. dict. 2. p. 79. Nab. albus Hook. fl. bor. am. 1. p. 294. Rami et invol. rubentia. Cor. albæ. Achænia flavida. Pappus cinnamomeus. (v. s.)
8. N. ALATUS (Hook. fl. bor. am. 1. p. 294. t. 102), caule simplici erecto glabro, foliis longè petiolatis deltoideis acutissimis sinuato-dentatis, petiolis alatis, paniculâ laxâ parvâ, capitulis nutantibus, foliis supremis pedicellis involucrisque pubescenti-hirsutis. (†) ad Fort-Vancouver et in insula Observatory in Americæ boreali-occidentalis littore. Flores albi? ut in N. suavi cui valdè affinis.
9. N. BOOTHII, caule erecto simplici apice pedicellisque subhirsutis, foliis glabris integriusculis, radicalibus petiolatis obtusis cordatis, mediis cordato-lanceolatis in petiolum attenuatis, summis lineari-lanceolatis acuminatis, racemo terminali