

un peu membraneuses sur les bords; la base du péricline entourée de plusieurs squamules, surnuméraires inégales, irrégulièrement disposées, paucisériées, imbriquées, appliquées, ovales, obtuses. Clinanthe planiuscule, nu, un peu fovolé. Ovaires oblongs, courts, s'allongeant un peu après la fleuraison, subcylindracsés ou subpentagones, glabres, lisses, à peine amincis vers la base, comme tronqués au sommet, sans col ni bourrelet apiculaire distinct; aigrette longue, très-colorée, même avant la fleuraison, rousse et comme dorée, jaune à la base, composée de squamellules nombreuses, inégales, filiformes, fortes, roides, très-cassantes, très-barbellulées. Corolles blanchâtres, entièrement glabres, à tube élargi de bas en haut, à limbe large. Styles très-longs, dépassant beaucoup le tube anthéral, à collecteurs noirs.

NABALE A TROIS FOLIOLES; *Nabalus trifoliolatus*, H. Cass. C'est une plante herbacée, dont la tige, haute d'un pied et demi, est dressée, presque simple, épaisse, cylindrique, glabre, ramifiée supérieurement en panicule; les feuilles sont alternes, étalées, glabriuscules, à pétiole bordé ou ailé par la décurrence des deux folioles latérales, à limbe divisé jusqu'à sa base en trois folioles lancéolées, inégalement et irrégulièrement dentées ou lobées, comme ciliées sur les bords, la médiaire plus grande, les deux latérales décurrentes sur le pétiole; les calathides sont nombreuses et disposées en grappes, qui sont réunies en une panicule terminale; chaque calathide est pédonculée, pendante, et composée d'environ douze fleurs, à corolle blanchâtre et à aigrette roussâtre. Nous avons décrit cette espèce sur un individu vivant, cultivé au Jardin du Roi, où il étoit étiqueté *prenanthes alba*, et où il fleurissoit vers la fin de Juillet.

NABALE TRILOBÉ: *Nabalus trilobatus*, H. Cass.; *An? Prenanthes alba*, var.  $\beta$ , Linn., *Sp. pl.*, édit. 3, pag. 1122. Cette plante, qui me paroît suffisamment distincte de la précédente, a la tige plus haute et plus épaisse; ses feuilles sont aussi plus grandes, pétiolées, à pétiole bordé ou ailé, à limbe trilobé, ayant le lobe terminal ovale-lancéolé, et les deux lobes latéraux irréguliers; les calathides, composées de onze fleurs, sont pendantes, et portées sur des pédon-