

4) *Aracium Pancicii* *

Syn. *Mulgedium Pancicii* Vis! plant. serb. pempt. p. 9
tab. IV.

Die folgenden nicht im Gebiete vorkommende Gattungen
der Crepideen führe ich zur Erläuterung an:

Paleyia Cass. dict. XXXIX. p. 393.

Involucrum imbricatum. *Achaenia* 20-costata. *Rhizoma fusiforme*. *Capitula magna, pauca*.

A. *Achaenia breve rostrata* = *Eupaleyia* Sz Bip.
a. folia dentato-pinnatifida.

1) *Paleyia* (*Crepis* Vill.) *albida* Cass. — Sz Bip.
Cichoriaceoth. n. 65. — Hispania, Gallia, Pedement.
b. folia lyrata.

2) *Paleyia* (*Crepis* in litt. ad amic. De Caisne et Spach)
oligocephala Sz Bip. Ms.

Ind. or.: Jacquemont; n. 1205 (v. sp. e herb. horti
paris.)

B. *Achaenia longe rostrata*. *Billotiopsis* Sz Bip.

3) *Paleyia billotioides* Sz Bip. Ms.

Abyssinia: Schimper! n. 778 an. 1853.

Habui nomine: *Barkhausiae* Schultzii (non Hochst!) ab
amic. Ed. Boissier! an. 1857.

Omalocline H. Cass. dict. XLVIII. p. 431. *Achaenia*
brevia, crassa, glabra, 20-striata. *Pappus biserialis, radiis*
inferne dilatatis, pl. dorso pubescentibus.

A. *Euomalocline* * *Pappus concolor, rhizoma præmor-*
sum, fibris longis crassisque ut O. hyoseridifoliae stipatum.

1) *O. pygmæa* Rehb. f.! *Cichor.* p. 50 t. 104. — Sz
Bip. *Cichoriaceoth.* n. 52. — *Crepis pygmaea* Lin.

B. *Dichroopappus* *. — *Achaenia castanea, ovata,*
utrinque truncata, compressiuscula, 20-striata, striis inter-
mediis obsolete. Pappus inferne flavescens:

2) *O. terglovensis* Sz Bip. *Cichor.* n. 148. — Leon-

todon terglovensis Hacquet pl. alp. carn. p. 11 n. 7 tab. 2 fig. 5 (an. 1782). — Hieracium hyoseridifolium Vill. mém. sur la découverte d'une nouv. espèce d'Hieracium c. icone! (an. 1807). — Pers. syn. II. p. 370 (an. 1807) qui Villarsii comment. ined. citaverat. — Crepis hyoseridifolia Tausch. B. Z. 1828, I. Ergänzungsbl. p. 79.

C. Dianthoseris * in Schimp. it. abyss. n. 755 et Flora B. Z. 1842 p. 439.—A. Rich.! Abyss. p. 465.—Schweinf. Beitr. p. 145. Pappus crassiusculus, inferne flavescens, dorso glaber. Rhyzoma fusiforme, simplex. Capitulum speciosum, inter folia rosulata, spathulata sensim in involucri squamas transeuntia, sessile.

3) Omalocline Schimper! *. — Crepis nivalis * olim. — In Abyssiniae alpebus alt. 9500—13,800': Schimper!

D. Daucomalocline * Achaenia pallida majora breve rostrata, obsoletius striata, Melanoberiniis affinia, pappus biserialis concolor radiis inferne dorso pubescentibus. Rhyzoma fusiforme, caulis foliatus capitulo specioso coronatus. Involucrum atro-virens. Receptaculi alveoli villosi.

4) Omalocline montana *. — Crepis montana Rehb.! — Tausch! Bisch.! Beitr. p. 299. — Hieracium montanum Jacq. — Hypochoeris pontana Cod. Lin. n. 5910.

Soyeria Monn.! ess. p. 74 ex parte. — Sz Bip. emend. — Achaenia cylindracea, glabra, 20-costulata, infra pappum persistentem, 1-serialem, niveum, denticulatum in collum attracta pl. discolor. — Herbae radice succisâ fibris longis crassisque instructâ: Sectio V. Succisocrepis Sz Bip. in Bisch.! Beitr. ex parte.

A. Involucrum subimbricatum. Achaenii flavo-brunnei collum discolor. = Trachelioracium *.

Soyeria hieracioides *. — Crepis hieracioides W. K. Hung. I. p. 71 t. 70. — Crepis succisaefolia Tausch. —