

4) *Aracium Pancicii* *

Syn. *Mulgedium Pancicii* Vis! plant. serb. pempt. p. 9
tab. IV.

Die folgenden nicht im Gebiete vorkommende Gattungen
der Crepideen führe ich zur Erläuterung an:

Paleya Cass. dict. XXXIX. p. 393.

Involucrum imbricatum. Achaenia 20-costata. Rhizoma fusiforme. Capitula magna, pauca.

A. *Achaenia breve rostrata* = *Eupaleyia* Sz Bip.
a. *folia dentato-pinnatifida.*

1) *Paleyia* (*Crepis Vill.*) *albida* Cass. — Sz Bip.

Cichoriaceoth. n. 65. — *Hispania, Gallia, Pedement.*
b. *folia lyrata.*

2) *Paleyia* (*Crepis in litt. ad amie. De Caisne et Spach*)
oligocephala Sz Bip. Ms.

Ind. or.: *Jacquemont*; n. 1205 (v. sp. e herb. horti
paris.)

B. *Achaenia longe rostrata. Billotopsis* Sz Bip.

3) *Paleyia billotioides* Sz Bip. Ms.

Abyssinia: Schimper! n. 778 an. 1853.

Habui nomine: *Barkhausiae Schultzii* (non Hochst!) ab
amic. Ed. Boissier! an. 1857.

Omalocline H. Cass. dict. XLVIII. p. 431. *Achaenia*
brevia, crassa, glabra, 20-striata. Pappus biserialis, radiis
inferne dilatatis, pl. dorso pubescentibus.

A. *Euomalocline* * *Pappus concolor, rhizoma præmorsum,*
fibris longis crassisque ut O. hyoseridifoliae stipatum.

1) *O. pygmæa* Rehb. f.! *Cichor.* p. 50 t. 104. — Sz.
Bip. *Cichoriaceoth. n. 52.* — *Crepis pygmaea* Lin.

B. *Dichroopappus* *. — *Achaenia castanea, ovata,*
utrinque truncata, compressiuscula, 20-striata, striis inter-
mediis obsoletis. Pappus inferne flavescens.

2) *O. terglovensis* Sz Bip. *Cichor.* n. 148. — Leon-