

CLASSIS SYNGENESIA.

ORDO POLYGAMIA AEQUALIS.

85. *SCORZONERA vaginata*: caule ramoso; foliis anguste linearibus, carinatis, nervosis, basi dilatato-vaginantibus, vaginis lanatis; bracteis filiformibus; calathi squamis externis brevioribus, margine sublanugineis.

Pl. sicc. Euphr. n. 117.

Ex oris Euphratis. *Perenn.*

Caulis ramosus, inferne sublanugineus, adscendens, in meis exemplaribus quadri-quinquepollicaris. Folia anguste linearia, dorso carinata, et nervosa, acuminata, basim versus sublanuginea, reliqua parte glabra, basi dilatata in vaginam amplexicaulem, plus minus lanatam praesertim margine, lana mollissima, longa, albente. Pedunculi terminales cauli, ramisque, solitarii, monocephali, sublanuginei, vel glabrati, adpersi una, alterave bractea filiformi, remota, longiuscula. Flores potius parvi, lutei. Calathi squamae lanceolatae, dorso atrovirentes, margine pallentes, inferiores breviores, acutae, plerumque lanugineae praesertim margine, supremae longiores, obtusiusculae, glabrae, subinde rubescentes.

86. *SCORZONERA lanata* *De Cand. Prodr. 7. sect. 1. p. 124. n. 51.*

Leontodon lanatum Amoen. Acad. 4. p. 287. excl. syn. Rauw.

Pl. sicc. Euphr. n. 31.

Ex collibus secus flumen prope pagum *Gorluk*. *Martio. Perenn.*

87. *OPORINA laciniata*: glabra; foliis pinnatifidis, laciniis angustissimis, acuminato-attenuatis.

Pl. sicc. Euphr. n. 132.

Ex oris Euphratis. *Ann.*

Radix longa, fusiformis, aut fusiformi-ramosa, modo crassiuscula, modo gracilior. Folia omnia radicalia, profunde pinnatifida, laciniis angustissimis, et subinde lineari-fi-

liformibus, inaequalibus, valde acuminato-attenuatis, longioribus patulis, brevioribus subinde runcinatis. Scapi e radice plures, decumbentes, ascendentes, simplices, monocephali, rarissime bifidi, et bicephali, nudi, aut superne una, alterave bracteola setacea adpersi. Calathi squamae lineares, accessoriae multo breviores. Corollae luteae. Achenia longe attenuato-subulata, striata, striis hispidulo-scabris. Pappus plumosus, sordidule albus, setis basi latioribus, achenio paulo brevior. Tota planta glabra, vel squamae calathi tantum subinde villis albis, molibus adpersae.

88. *HYPOCHAERIS*? *serioloides*: foliis petiolatis, pubescentibus, obverse oblongo-spathulatis, sinuatis, lobo impari majore, tridentato; scapis radicalibus, monocephalis; calathis subglabris.

Pl. sicc. Euphr. n. 15.

Ex viciniis hortorum ad portum *William. Martio. Ann.*

Radix gracilis. Folia omnia radicalia, longiuscule petiolata, obverse oblongo-spathulata, sinuata, lobo impari majore, tridentato, reliquis deorsum decrescentibus, utrinque, petiolisque pubescentia. Scapi duo-tres, radicales, erecti, simplices, monocephali, nudi, pubescentes, et densius superne, unum-tres pollices longi. Flores potius parvi, lutei. Calathi squamae glabrae, vel carina subpilosae, dorso atrovirentes, margine pallentes, accessoriae lanceolatae, multo breviores, interiores lineares, utraeque acuminatae.

89. *KOELPINIA linearis* *De Cand. Prodr. 7. sect. 1. p. 78. n. 1. a.*

Lapsana Kölpinia *Lin. fl. Sup. p. 348.*

Rhagadiolus Koelpinia *Willd. Sp. pl. 3. p. 1626.*

Pl. sicc. Euphr. n. 138.

Ex oris Euphratis. *Ann.*

90. *NOLOBASIS syriaca* *De Cand. Prodr. 6. p. 660. n. 1.*

Carduus syriacus *Sp. pl. p. 1153.*

Cnicus syriacus *Willd. Sp. pl. 3. p. 1683.*

Pl. sicc. Euphr. n. 183.

Ex oris Euphratis. *Ann.*