

- ♂. *Alpina* (Gaud. fl. helv. 5. p. 59. Schleich. pl. exs.), scapo simplici 1-cephalo, involuero pilis nigris hispido. ♀ in Alpibus ad summum montem Fouly (Schl.), etc. Hall. helv. n. 28. ♂. (v. s.)
2. *O. PRATENSIS* (Less. syn. 132), scapo ramoso, foliis sinuato-dentatis pinnatifidisve glabris, involuero fusco-villoso. ♀ in Germaniæ pratis ut videtur rara. *Apargia pratensis* Link ex Less. l. c. Horn. h. hafn. 2. p. 758. *Leontodon pratensis* Reichenb. fl. exc. 1. p. 253. Species genuina mihi planè ignota. †
- ♀? *Reuteri*, scapo bifido sub capitulis hirtello, foliis glabris dentato-runcinatis, involuero pilis, aliis albis, aliis nigris, hispido. ♀ in Alpibus ad vallis Albæ lacum Combal legit cl. Reuter. Scapi folia duplò superantes. Capitula subcampanulata ad basin et ad apices pedicellorum bracteolata. Pappus ut in *O.* autumnali rufescens plumosus. An species diversa? (v. s. comm. à cl. inv.)
3. *O. HISPIDULA*, foliis ad collum rosulatis lanceolatis dentato-pinnatifidis hispidulis dentibus acutis, scapis erectis 1-2-cephalis basi villosis suprâ glabris, invol. imbricato hispidulo. (I) in Ægypto secus vias inter Kabiram et Bakatym (Delil. Bové! Coqueb. Auch.!) et ad ripas Euphrati (Chesn.). *Crepis hispidula* Delil. fl. eg. p. 117. t. 42. f. 1. *Scorzonera hispidula* Spreng. syst. 3. p. 667. *Achænia oblonga*, transversè sulcato-rugosa, per anthesin vix apice angustata, demùm apice rostrata. Pappus 1-serialis plumosus setulis later. deciduis. Invol. variat glabrum puberulum aut valdè hirsutum. An *Millinæ* sp.? (v. s.)
4. *O. MICROCEPHALA* (Boiss. ined.), glabra, scapo adscendente simplici apice parè squamoso, foliis linearibus aut lineari-sublanceolatis vix basi attenuatis, integerrimis aut subdentatis, invol. oblongo nigricante glaberrimo. ♀ in vallibus et pratis humidis regionis suprænæ jugi Granatensis Sierra Nevada dicti legit cl. Boissier! Omnino affinis *Leontod.* squamoso sed invol. multò magis angustum. Genera *Leontodontis* et *Oporiniæ* jungens. (v. s.)

DCCCVII. MILLINA. — *Millina* et *Deloderium* *Cass. dict.* 31. p. 89. 48. p. 430. *Less. syn.* 132 et 143. — *Apargiæ* sp. *Ten. Biv.*

Capitulum multiflorum. Invol. subuniseriale, squamis accessoriis linearibus plurimis auctum ferè calyculatum. Recept. nudum aut ambigùè paleaceum. Achænia omnia conformia oblonga transversè striata in rostrum longum desinentia. Pappus 1-serialis plumosus subsordescens rigidulus. — Herbæ Australi-Europæe perennes acaules. Folia radicalia glabriuscula aut pilosula runcinato- aut sinuato-dentata. Scapi glabri striati, 1-cephali, rariùs bifidi, squamis præsertim ad apicem instructi. Invol. pilis simplicibus hispidulum. Flores flavi, exteriores dorso purpurascens.

Sect. I. EUMILLINA. — *Millina* *Cass. l. c.*

Recept. nudum. Rostrum achænio ferè longius. Pappi setæ non basi dilatatæ.

1. *M. LEONTODONTOIDES* (*Cass. l. c.*), foliis ellipticis basi runcinato-dentatis, scapo simplici foliis triplò longiori. ♀ in sylvis montosis Æthnæ (*Biv. Guss.*) ad alt. usque 5200 ped. (*Schouw!*), in pascuis montosis regni Neapolitani (*Ten.*), in monte Gargano (*Schouw!*). *Apargia cichoracea* *Ten.* prod. 46. fl. nap. 2. p. 166. t. 71. *Apargia fasciculata* *Biv. st. rar. manip.* 2. t. 2. Habitus ferè *Leontodontis* squamosi. Radices grumosæ fasciculatæ. Invol. nigricans subvillosum pilis albis. (v. s.)

Sect. II. DELODERIUM. — *Deloderium* *Cass. l. c.*

Recept. paleis paucis membranaceis instructum. Rostrum achænio brevius. Pappi setæ basi membranacæ dilatatæ. — An genus proprium?