

Herba brevissime caulescens vel subacaulis sex ad duodecim pollices alta, densifolia, scapos monocephalos plures rarius solitarium proferens. Radix perpendicularis, lignosa, simplex, apice in radiculas paucas, filiformes soluta, sesquipollucaris, extus brunnea. Rhizoma brevissimum, simplex, rarius bi-vel trifidum, foliorum emarcidorum reliquiis tectum. Folia numerosa, patulo erecta, fere aequalia, villis mollibus, brevibus, albidis, nitidis utrinque parcus adspersa, ciliata, linearia, pinnatifida, basi dilatata, complanata, laciinis oppositis vel alternis, acutissimis, terminali interdum linearie lanceolata, costa complanata percursa, circiter bipollucaria vel parum longiora. Scapi solitarii vel duo ad tres erecti, floridi submutantes, fructiferi stricti, teretes, nudi, juniores undique villosi, seniores praeter apicem glabri, nitidi. Capitula erecta, mediocria, homogama, flava. Involuci campanulati foliola circiter triseriata, parum inaequalia, omnia adpressa, acuta, exteriora s. l. tenuiter pubescentia, lanceolata, interiora parum longiora, glaberrima, scariosa, pallida. Corollae ligulatae, squamas involuci interiores haud superantes, glaberrimae, tubo filiformi, ligulam quinquedentatam, ad dentes calloso incrassatam, quinquenerviam adaequante. Stylus breviter exsertus, apice s. l. tenuiter puberulus, ramis conniventibus, brevibus, obovatis, intus planis, dorso convexis. Antherae basi nudae, apice parum exsertae. Achenium oblongum, immaturum rectum, rostro suo brevius, maturum curvatum, in rostrum gracillimum, ipso fere longius sensim attenuatum, costis circiter decem suberosis, ancipitibus insigne, in costis s. l. sebum, castaneum; pappus pilosus, setis simplicissimis, aequalibus, multiseriatis, albis, nitidis constans, corollarum tubum adaequans. Receptaculum planum, alveolatum, fructibus delapsis squamulis minutis scabridum.

Explicatio tabulae CCLXIII. TRICHOSERIS ALPINA. — 1) Capitulum m. a. 2) Involuci squama exterior 3) item interior. 4) Floculus integer. 5) Corolla 6) Ligulae apex. 7) Stylus. 8) Achenium. 9) Ejusdem pars transversim secta.

II. TRICHOSERIS PTEROCARPA.

T. villoso canescens; foliis linearie lanceolatis, integerrimis, dentatis vel inciso dentatis; scapo fructifero folia duplo excedente; involuci laciinis inaequalibus, villosis, patulis, extimus squarrosis; achenio costato, trialato, intus plano, quam rostrum breviore.

MACRORHYNCHUS PTEROCARPUS. FISCH. et MEYER ex DC. l. c.

Crescit in Chile borealis glareosis graminosis convallis los Chorillos ad Concon. Octobre florebat.

Herba habitu praecedentis sed minus gracilis, in apricis crescentsaepe pumila, acaulis, scapum solitarium quam folia breviorem ferens, solum uberioris colens altior, scapos quinque ad sex proferens. Distinguitur ab illa villositate; squamis involuci interioribus exteriores multum excedentibus, acuminatis, post fructificationem fere subulatis; demum acheniorum forma. Folia admodum varia. Ligulae extus aurantiae.

O R E O P H I L A.

OREOPHLA *Don* in *Linn. Transact. XVI. 178.* et *Philosoph. Magaz. 1832.* *ENDLICH.* gen. un 2984. **HYPOCHAERIDIS** sp. *H. B. Kth. nov. gen. IV. 2. tab. 301.* **ACHYROPHORI** spec. *Dc. Synops. VII. 93.*

OREOPHLA ODORATA. TAB. CCLXIII.

O. caule solitario, simplice, aphylo et involuci foliolis exterioribus setoso hispidis; foliis lanceolatis, sinuato dentatis, utrinque laevibus, costa villosis, margine scaberrimis.

Crescit in Chile australis glareosis montis Pico de Pilque. Januario floret.

Herba pedalis vel parum humilior, brevissime caulescens. Radix nunc perpendicularis nunc obliqua, simplex, lignosa, apice radiculas ferens, extus fusca, digitum longa, penna corvina crassior. Folia omnia radicalia, numerosissima, patula, invicem aequalia, lato lanceolata, acutissima, in petiolum dilatatum decurrentia, sinuato dentata, laciinis inciso

dentatis, mucronatis, utrinque laevia, nitida, subtus in costa breviter villosa, margine scaberrima, membranacea, viridia, duos ad quinque pollices longa. Scapus in nostris semper solitarius, strictus, folia duplo excedens, extimo apice squamulas paucas integras, breves, nec folia ferens, subangulatus, striatus, inferne laevis, a medio inde spinuloso hispidus, purpurascens, interdum octo pollices altus. Capitulum magnum ovato campanulatum. Involuci circiter quinqueseriat foliola adpressa oblongo lanceolata, acuta: interiora parum longiora, margine scariosa, glabra: exteriora viridia, margine hispidula: extima dorso et marginibus setis rigidis hispida. Corollae tubus basi filiformis, apice inflatus, ligulam planam, quinquedentatam, aurantiacam adaequans. Stylus longe exsertus, ramis revolutis, cylindraceis, undique pubescentibus, superne ad medium usque seriem glandularum stigmaticarum ferentibus. Achenium oblongum, obtuse quinquangulare, glabrum, erostre. Pappus uniserialis, setis basi paulo dilatatis, rigidis, plumosis, albidis. Receptaculum planum, paleis onustum oblongis, complicatis, apice inaequaliter trifidis, dente medio subulato tanquam uncinatis, corollae tubum adaequantibus. — Odor floris suavis.

Explicatio tabulae CCLXIII. OREOPHLA ODORATA. — a) Involuci foliolum exterius, b) item interius. c) Palea. d) Floculus integer cum palea sua. e) Stylus. f) Achenium discesso pappo. g) Pappi pars.

BARBIRIBIA MELANURA. TAB. CCLXIV.

Herba pedalis vel parum humilior, brevissime caulescens. Radix nunc perpendicularis nunc obliqua, simplex, lignosa, apice radiculas ferens, extus fusca, digitum longa, penna corvina crassior. Folia omnia radicalia, numerosissima, patula, invicem aequalia, lato lanceolata, acutissima, in petiolum dilatatum decurrentia, sinuato dentata, laciinis inciso

*Trichoseris alpina.**Oreophila odorata.*