

revolutis, involucri squamis exterioribus spinulosis, interioribus lanceolatis acutis membranaceis integerrimis.

Tota planta bipollicaris, glaberrima. Folia omnia caulis basi aggregata, dense imbricata, semipollicaria $1\frac{1}{2}$ lineas lata, recurvata, coriacea, rigida, acute pungentia. Scapus nudus, apice parce foliolosus, vix pollicaris; foliis linearibus squamaeformibus. Capitulum speciosum, $\frac{3}{4}$ pollicis longum; squamae involucri extimae minimae foliaceae, intimae maiores, cartilagineo-membranaceae, lineari sublanceolatae, uninerves, acutae.

Proximus subsequenti, sed iam foliis integerrimis satis differt.

Chile: Cordillera de S. Fernando. (v. s.)

Homoianthus linearis DeC. Prodr. VII. 64. 6.

Chile: ad declivitates fluvii Tinguiriricae, altitudine 4—5000 pedum. (v. s.)

TRIXIS P. Br.

Trixis frutescens P. Br. DeC. Prodr. VII. 69. 12.

Peruvia: circa Tacnam. (v. s.)

Tribus VIII. CICHORACEAE Vaill.

OREOPHILA Don. (*Linn. Transact.* XVI. 178.)

Endlicher Gen. plant. n. 2984.

Oreophila taraxacifolia M. et Walp. acaulis, glabra, foliis stellato-imbricatis lanceolatis runcinato-pinnatifidis in petiolum basi late vaginantem attenuatis, capitulo sessili cylindraceo non longioribus.

Rhizoma perpendiculare, pennae columbinae crassitie, folia stellatim imbricata. Capitulum sessile, fere pollicare; involucri squamae triseriales, glabrae, ovato-lanceolatae, obtusae, margine apiceque scariosae. Flores omnes homogami ligulati, ligulis linearibus, apice tri-

dentatis truncatis. Achaenia ovali-compressa, glabra, erostris; pappus uniserialis, longe plumosus. Herbula perennis.

Peruvia: in planitie circa Tacoram, altitudine 14—17,000 pedum. (v.s.)

Oreophila Meyeniana Walp. acaulis, glabra, foliis stellatim-imbricatis lanceolatis runcinatis, lobis obovatis obtusissimis integerrimis vel tridenticulatis basi late vaginantibus attenuatis, capitulo intra folia sessili cylindraceo multo longioribus.

Rhizoma fusiforme, digiti fere crassitie. Folia bipollicaria, 4—5 lineas lata, infra medium longe attenuata, integerrima vel hinc inde dentata, supra medium grosse runcinata. Capitulum sessile, semipollicare; involucri squamae lanceolato-lineares, acuminatae. Flores homogami, ligulati, apice acute quinquedentati truncati. Caetera ut in praecedente.

Peruvia: in planitie circa Tacoram, altitudine 14—17,000 pedum. (v.s.)

ACHYROPHORUS Scop.

Achyrophorus tenuifolius DeC. Prodr. VII. 94. 12.

γ, Neacanus DeC. l. c.

Acaulis, foliis omnibus radicalibus linearibus acutis integerrimis aut hinc inde pinnatifido-dilatatis inciso-dentatis glaberrimis, scapo radicali, medio foliolo squamoso aucto, striato monocephalo apice lanato-tomentoso, involucri squamis ovatis acuminatis, superioribus ovato-lanceolatis, omnibus margine scariosis hirsuto-ciliatis, corollis involucri non multo longioribus.

Scapus quinquepollicaris. Folia 3—4½ pollices longa, 2—4 lineas lata. Capitulum 10 lineas longum.

Chile: Cordillera de S. Fernando. (v.s.)