

4) *Aracium Pancicii* *

Syn. *Mulgedium Pancicii* Vis! plant. serb. pempt. p. 9
tab. IV.

Die folgenden nicht im Gebiete vorkommende Gattungen
der Crepideen führe ich zur Erläuterung an:

Paleyia Cass. dict. XXXIX. p. 393.

Involucrum imbricatum. *Achaenia* 20-costata. *Rhizoma fusiforme*. *Capitula magna*, pauca.

A. *Achaenia breve rostrata* = *Eupaleyia* Sz Bip.
a. *folia dentato-pinnatifida*.

1) *Paleyia* (*Crepis* Vill.) *albida* Cass. — Sz Bip.
Cichoriaceoth. n. 65. — Hispania, Gallia, Pedement.
b. *folia lyrata*.

2) *Paleyia* (*Crepis* in litt. ad amic. De Caisne et Spach)
oligocephala Sz Bip. Ms.

Ind. or.: Jacquemont; n. 1205 (v. sp. e herb. horti
paris.)

B. *Achaenia longe rostrata*. *Billotiopsis* Sz Bip.

3) *Paleyia billotioides* Sz Bip. Ms.

Abyssinia: Schimper! n. 778 an. 1853.

Habui nomine: *Barkhausiae Schultzii* (non Hochst!) ab
amic. Ed. Boissier! an. 1857.

Omalocline H. Cass. dict. XLVIII. p. 431. *Achaenia*
brevia, *crassa*, *glabra*, 20-striata. *Pappus biserialis*, *radiis*
inferne dilatatis, *pl. dorso pubescentibus*.

A. *Euomalocline* * *Pappus concolor*, *rhizoma præmor-*
sum, *fibris longis crassisque* ut *O. hyoseridifoliae stipatum*.

1) *O. pygmæa* Rchb. f.! *Cichor.* p. 50 t. 104. — Sz
Bip. *Cichoriaceoth.* n. 52. — *Crepis pygmæa* Lin.

B. *Dichroopappus* *. — *Achaenia castanea*, *ovata*,
utrinque truncata, *compressiuscula*, 20-striata, *striis inter-*
mediis obsolete. *Pappus inferne flavescens*:

2) *O. terglovensis* Sz Bip. *Cichor.* n. 148. — Leon-