

Ac. Sci. RPKD(Pyongjang) conservatur.

ㄷ) *Erigeron* L.

8. *Erigeron zosonius* Pak, sp. nov.

Planta biennia. Rhizoma brevis repens. Caulis erectus 50~80cm altus, 3~4 mm in diametro, pilosus vel fere glaber, tota longitudine foliosus. Folia radicalia rosularia, sub anthesi emarcida, integra, oblanceolata. Folia caulina alterna, 8~13cm longa, 1.2~1.3cm lata, lanceolata vel oblanceolata, integra, apice acuta, basi paulo angustata, cuneata, sessilia, supra viridia pilosa, subtus pilosa, margine dense pilosa, folia superiora sessilia minuta. Calathidia pedunculata (pedunculus 2.5~3cm longus), in formam umbellatam conferta. Involucrum campanulatum, 4~5mm altum. Involucri phylla biseriata, conformia, apice tenuiprotracta, exteriora dorso glandulosa, interiora dorso centro pauciglandulosa vel glabra, margine membranacea. Flores in calathidio trimorphi. Flores radii feminei dimorphi: exteriores ligulati, 6mm longi, ochroleuci, pars ligulatae-tubis longior, interiores tubulosi, tenuitubiformes 4mm longi, ochroleuci, pistillum ejus 6mm longum. Flores disci hermaphroditi, infundibulares 4.8mm longi, flavi, apice 5-valves, pistillum 5.8~6mm longum. Achenia oblongo-lanceolata, glabra, 1.8mm longa, prominenter bicostulata. Pappus uniseriales, 6mm longus, castaneus. Anth. V~X.

Hab.: Partis borealis Koreae.

typus: Prov. Riangando, 16. VII. 1990, № 237; in Herb. Inst. Bot. Sect. Biol. Ac. Sci. RPKD(Pyongjang) conservatur.

Affinitas: Species mea affinis est *E. kamtschaticus*, sed foliis integris, floribus ligulatis ochroleucis, pappis castaneis discrepat.

ㄴ) *Aster* L.

9. *Aster ageratoides* var. *spiraefolius* Pak, var. nov.

A typo foliis minutis, caulibus et involucri phyllis purpureis, floribus ligulatis (6mm long., 2.3mm lt.) brevibus discrepat.

Hab.: Partis borealis.

typus: Prov. Zagangdo 11. VII. 1987, № 4013; in Herb. Inst. Bot. Sect. Biol. Ac. Sci. RPKD(Pyongjang) conservatur.

ㄹ) *Solidago* L.

10. *Solidago coreana* var. *spatulifolia* Pak, var. nov.

A typo foliis spathuliformibus, caulibus debilibus discrepat.

Hab.: Partis mediae Koreae.

typus: Prov. Gangwondo, 17. VII. 1985, № 2127; in Herb. Inst. Bot. Sect. Biol. Ac. Sci. RPKD(Pyongjang) Conservatur.

ㄺ) *Paraixeris* Nak.

11. *Paraixeris denticulata* var. *dilatata* Pak, var. nov.

A typo foliis ovoideis, basi cordatis, amplexicaulibus discrepat.

Hab.: Partis borealis Koreae.

typus: Prov. Pyongnamdo, 18. VII. 1986, № 1125; in Herb. Inst. Bot. Sect. Biol. Ac. Sci. RPDK(Pyongjiang) Conservatur.

o) *Crepis* L.

12. *Crepis coreana* form. *glabriuscula* Pak, form. nov.

A typo involucris phyllis dorso glabris discrepat.

Hab.: Partis borealis.

Typus: Mont. Paektusan, 16. VII. 1989; № 2216; in Herb. Inst. Bot. Sect. Biol. Ac. Sci. RPDK(Pyongjiang) Conservatur.

z) *Senecio* L.

13. *Sectio Koreanogeni* Pak, sect. nov.

Planta perennis. Folia alterna, petiolata, integerrima, late triangulata. Phyllaria appedicularia inferne calathidii nulla. Achenia glabra. Pappus niveus.

Typus sectionis: *S. koreanus* Komar.