

- Calendula bicolor Viv.* — Ile Gavdo.  
*Echinops glandulosus Weiss.* — Sitia.  
*Carduus albidus M. Bieb.* — Chersonisis.  
*Sonchus glaucescens Jord.* — Enneachoria.  
*Phœnixopus alpestris Gdgr* sp. n.<sup>1</sup>.  
*Picridium tingitanum Desf.* — Chersonisis.  
— *maritimum Rchb.* — Chersonisis. Candie. Rethymo.  
*Taraxacum apenninum DC.* — Lassithi.  
*Phalacroderis coa DC.* — Mirabello.  
*Rhagadiolus intermedius Ten.* — Enneachoria.  
*Podospermum syriacum Boiss.* — Sitia  
— *graminifolium Grisb.* — Mirabello.  
— *idæum Gdgr* sp. n.<sup>2</sup>.  
*Cichorium hirsutum Gren.* — Canée.  
*Hedypnois monspeliensis Willd.* — Candie. Sitia.  
*Specularia birta (Ten.)* — M. Sphaciotes. Enneachoria.

apicem lœvia, interna vero glabra, paleæ aristatæ, non carinatæ, planæ; achænia scabridula oblonga.

*Hab.* Creta orient., in prov. Sitia ad Phaneromani et Mavro.

Species nullæ affinis. Ab *E. exigua* S. S., cui accedere videtur, valde recedit caulis elongatis, foliorum et florum forma.

4. **Phœnixopus alpestris** Gdgr mss. — Probabilis perennis, radice crasso, elongato, fusiformi; rami diffusi, tenues, flexuosi, breves; folia inferiora pinnatisecta, segmentis parvis, integris, acutis, superiora integra; capitula sessilia, pauciora, plerumque solitaria, phylla involucri viridi-rubescens omnia subobtusa, ad margines pallida; flosculi 3-4, aurei; achænia oblonga, nigricantia.

*Hab.* Creta, in alpestribus Lassithi et montis Idæ.

Herba glaucescens, 1/2-pedalis, diffusa; capituli 8 mm. longi. — Notis indicatis a *Ph. vimineo* multum distat.

2. **Podospermum idæum** Gdgr mss. — Totum adpresse cano-argenteum, pubes floccoso-crispula; radix cylindrica, carnosa, collo non squamoso; folia omnia radicalia, conferta, longe linearia, valde crispoundulata, patulo-deflexa; caules scapiformes, monocephali, flexuosi, plerumque nudi, folia plus minusve æquantes; capitula parva; involucri cani angustati phylla pauca, inferiora subobtusa, externa vero oblongo-acuta, albo-marginata; flosculi sulfurei, concolores, involucro æquilongi, achænia externa sultata, squamulosa, interna lœvia; pappus niveus.

*Hab.* Creta, ad nives deliquescentes montis Idæ infra cacumen Timios Stavros et supra Platanos, sub dumetis *Berberidis creticæ*, in consortio *Chionodoxæ*, *Croci Sibthorpii*, *Dactylidis rigidæ*, *Centaureæ idææ*, *Corydalidis unifloræ* permultorumque aliorum rariorum.

A *P. villoso* Stev. ejusque formis valde recedit foliis confertis, dense rosulatis, linearibus, crispatis, floribus minoribus, scapiformibus, phyllorum fabrica, pappo, etc.