

naccis inter flores instructum. Achænium teres sulcis paucis exaratum laeve brevissimè attenuato-rostratum. Pappus 1-serialis, setis angustis semi-lanceolato-linearibus plumosis. — Herba glabra reg. Mediterraneæ incolæ, habitu Thrinicias referens, subcaulis. Folia radicalia runcinato-pinnatifida, lobis integris, terminali submajore. Scapi plures nudi 1-cephali foliis duplò longiores. Flores citrini. — Genus à cl. Richard subodoratum, affine Seriola, sed achænio suberostri et invol. seriali diversum.

1. R. TARAXACOIDES (DC. l. c.) ♀ in rupestribus editiorum montium Corsicæ (Rob. ! Req. ! Salz. ! Thom. ! Rob. !), Sardinie (Thom. ! Noris !), Liguria orientalis (Bertol. !), Sicilia in regione sterili montis Ethna (Schouw ! Riv.), Samnii et Aprutii (Guss. !). Variat ex Guss. foliis scapisque ciliato-hispida, Seriola uniflora Riv. pl. sic. cent. 2. n. 55. Seriola taraxacoides Lois. fl. gall. 530. t. 18. Hieracium Æthiense, etc. Cup. h. cath. 96. pœuph. sic. 2. t. 190. (v. s.)

f. *tricholepis*, involuero hispido. ♀ hsh. cum var. priore. R. taraxacoides
f. *hirta* Duby ! bot. gall. Folia et scapi glaberrimi. (v. s.)

† *Species exclusa.*

- R. PINNATIFIDA Spreng. = *Achyrophora pinnatifida*.

DCCXCVI. METABASIS.

Capit. multiflorum. Invol. biserialis squamellis paucis calyculatum, squamis acuminatis dorso spinellosis. Recept. paleis tenuibus scariosis inter flores onustum. Achænia lineariteretiuscula, radii breviter, disci longè rostrata. Pappus 1-serialis, radii squamellosus brevissimus, disci elongatus plumosus. — Herba Robertiæ facie. Folia pleraque radicalia hirtella runcinato-pinnatifida, lobis acutis, sinibus obtusis. Caulis à basi ramosi glabri subnudi apice 1-cephali. Flores lutei, exter. subtus rubentes. — Genus medium inter Robertiam et Phalacroderim et à priore ad posterius transitum faciens, undè nomen (*μεταβασις*, transitus.)

1. M. HYMETTIA. ♀ ? in Atticæ monte Hymetto detexit cl. Ancher-Eloy ! *Hypochris pinnatifida* Aub. ! pl. exs. n. 3354. non Cyr. (v. s. à cl. inv.)

DCCXCVII. PHALACRODERIS.

Capit. multiflorum. Invol. biserialis, squamis acuminatis, ext. brevioribus laxiusculis, int. duplò longioribus subconcavis. Recept. paleis linearibus membranaceis invol. longitudinem æquantibus onustum. Achænia linearia teretiuscula glabra in collum elongatum apice callosulum producta. Pappus subnullus, paleolis nempe minimis in coronulam subconcretis. — Herba Archipelagica annua erecta aut subdiffusa. Folia inferiora petiolata pinnatifida, lobis acuminatis, terminali majore; caulina pauca sessilia, nunc pinnatifida, nunc basi dentata. Rami floridi elongati nudi 1-cephali. Cor. flavæ. Invol. setoso-hispida. — Nomen ex φαλακρὸς calvus et δῆρι collum, ob achæmium longè rostratum et primâ fronte omninò calvum.

1. P. COA. ① In summis montibus Insulæ Coe legit cl. d'Urville sed in ejus enim non tuò agnoscere queo. *Crepis* seu *Barkhamia* d'Urv. ! pl. exs. 1890 et 1891 fortè *Crepis fetida* var. *Coa* d'Urv. enum. n. 754. Herba foliis ad *Barkhamiam fetidam* anharecedens, sed fructificatione omninò ab eâ abhorrens. (v. s. comm. à cl. inv.)