

DCCCXXXVIII. PICRIDIVM Desf. fl. atl. 2. p. 220. DC. fl. fr. 4. p. 15. Poir. dict. sc. nat. 40. p. 195. Less. syn. p. 140. excl. Nees. syn. — Reichardia Roth bot. abb. p. 35. Mench meth. p. 16. non Roth cat. nec nov. gen. — Scorzonera sp. Linn. — Sonchus sp. Lam.

Capit. multiflorum. Invol. ovatum imbricatum, squamis margine albis. Recept. nudum areolatum. Achænia conformia exalata 4-angulata prismatica transversè tuberculata aut rugosa apice truncata erosaria. Pappus pluriserialis pilosus. — Herbarum sicut vix suffrutices regiones Mediterraneas habitantes. Folia amplexicaulia. Flores latei. Pedunculi sæpè clavati.

1. P. TINGITANUM (Desf. fl. atl. 2. p. 220), caule herbaceo ramoso, foliis omnibus pinnatifido-runcinatis semiamplexicaulibus denticulatis, pedunculis squamosis, invol. squamis exterioribus squarrosis. ♀ in rupibus maritimis Barbariarum præsertim Tingitanæ, Egypti (Forsk.), Siciliæ (Guss.), et in ins. Balearicis (Camb.). Eandem verisim. introductam in insulâ Van Diemen lectam vidi in herb. Cann. Scorzonera Tingitana Linn. sp. 1114. Sonchus Tingitanus Lam. dict. 3. p. 397. Scorz. Tingitana et Sc. ciliata Forsk. fl. eg. p. 243 ex Delil. III. 24. Reichardia Tingitana Roth. Reichardia runcinata Mench. Sonchus hispidulus Bore! pl. ex. n. 30. Sonchus pinnatifidus Lag. — Herm. lagdb. 659. ic. Capitula in icone justo minorâ; sunt enim P. vulgaris majora. (v. s.)

♂? diversifolius, foliis inferioribus obovatis sinuatis dentatis, super. pinnatifidis lobis grosse dentatis. ①? in agro Mogadoriensis legit cl. Bronsomet. Invol. squamæ latè ut in P. Tingitano albo-marginata. An sp. propr.? (v. s.)

2. P. LIGULATUM (Vent. malm. p. et t. 68), glabrum glaucum, caule basi fruticoso ramoso, foliis amplexicaulibus ligulatis inæqualiter spinuloso-dentatis, pedunculis apice incrassatis subsquamosis, invol. basi tumidi squamis imbricatis, ext. subcordatis. ♀ in Africa Mogadoriensis (Bronson!) et fortè in insulâ Palmæ Canariensis (Ch. Sm.), in Græciâ rupibus ad arcem Palamidem (Zucc!), in insulâ Zacyntho (Marg!). Sonchus intermedius Jan! pl. ex. ex Sicilia ortus, hoc forsân pertinet. Species mihi dubia! (v. s. sp. et c.)

3. P. ARABICUM (Hochst. et Steud! in Schimp. pl. ex. arab. n. 833), caule herbaceo erecto, foliis infer. obovatis, super. ovato-oblongis, omnibus cordato-amplexicaulibus subciliatis hinc indè subdentatis, pedicellis vix demùm apice-obconicis, invol. squamis inter. subcordatis. ①? ②? in palmetis vallis Arabicæ Fatmæ propè Umsert febr. flor. legit cl. Schimper! An var. latifolia P. ligulati, aut var. integrifolia P. Tingitani? (v. s. ex un. ita.)

4. P. VULGARE (Desf. fl. atl. 2. p. 221), caule herbaceo parè ramoso apice nudo, foliis infer. pinnatifidis, super. integris subdentatis amplexicaulibus, pedunculis squamosis, invol. squamis adpressis. ①, ② in arvis cultis et asperis regionis Mediterraneæ. Scorzonera picroides Linn. sp. 1114. Sonchus picroides Lam. dict. 3. p. 398. All. ped. t. 16. f. 1. Gartn. fr. 2. p. 359. t. 158. f. 2. Sonchus squamosus Lam. fl. fr. 2. p. 87. Reichardia picroides Roth abb. p. 35. Reichardia integrifolia Mench meth. 546. — Lob. ic. t. 236. f. 2. Vulgò Terra crepola Ital. (v. v.)

5. P. ORIENTALE (DC. fl. fr. adn. 4. p. 16. Pers. ench. 2. p. 362), caule humili subramoso unifolio, foliis radicalibus obovatis acutè duplicato-denticulatis, pedunculis nodis, invol. squamis mucronatis margine latè membranaceis. ① in Oriente (Linn.), in Syriâ (Labill!), ad montem Sinaï (Auch!). Scorzonera orientalis Linn. sp. 1113. Herba circ. 2-3 pollic. glabra aut hinc indè subsetulosa, habitû ferè Taraxaci. An satis à P. Tingitano differt? (v. s.)

6. P. HISPANICUM (Poir. dict. sc. nat. 40. p. 197), caule herbaceo ramoso, foliis amplexicaulibus oblongis pinnatifidis setuloso-ciliatis glaucis utrinque albo-