

punctatis, pedunculis incrassatis squamosis, invol. squamis mucronatis squarrosis. (1) in Hispaniae arenosis maritimis circâ Malagam et in regno Valentino. Sonchus Hispánicus Jacq. hort. schoenbr. 2. p. 9. t. 143 Spreng. syst. 3. p. 649. Pierid. pinnatifidum Lag. nov. gen. et sp. in hort. madr. cat. p. 24. Herba stricta bipedalis. Folia caulinâ 4 poll. longa.

7. P. DICHOTOMUM (Fisch. et Mey. pl. Szow. ined.), glaucum glabrum, caule erecto apice dichotomo, foliis cordato-amplexicaulibus elongatis sinuatâ spinuloso-denticulatis, pedunculis teretibus subsquamosis, invol. squamis adpressis. (2)? in lapidosis abruptis Caucasi orient. (Bieb.), in Iberiâ circâ Tiflî (Stêv.!), in glareosis Armeniæ et prov. Aderbeischan (Szowitz! Anch. n. 3412.) et forte in Syriâ (Labill.). Sonchus dichotomus Bieb. fl. taur. n. 158. Willd. sp. 3. p. 1518? Spreng. syst. 3. p. 649. Herba stricta bipedalis. Folia caulinâ 4 poll. longa, 5-6 lin. lata; radicalia ign. Cor. flavæ involvencro paulò longiores. (v. s.)

† *Species exclusa.*

P. ALBIDUM DC. = Barkhausia albida.

DCCCXXXIX. ZOLLIKOFERIA DC. non Nees. — Scorzonerae et Sonchi sp. auct.

Capitulum multiflorum. Invol. ovato-oblongum imbricatum, squamis margine scariosis, exter. brevioribus. Recept. nudum. Achænia cylindracea vix subtetragona erostria, subtiliter striata, glabra seu brevissimè pubescentia, minimè tuberculata exasperata, imâ basi (saltem in Z. chondrilloide) cornubus 4 brevibus deorsum directis instructa. Pappus pluriserialis sessilis pilosus mollis. — Herbæ regionis Mediterraneæ incolæ, glabræ, ramosæ. Folia pinnatilobata, lobis dentibusve demum apice albo-callosa. Flores lutei. — Cum Neesii Zollikoferia ob ius prioritatis nomen Willemetia consensu generali obtinuerit, hoc novum genus cl. G. T. Zollikofer Sancto-Gallensi botanico lubens dicavi.

1. Z. PUMILA, caule brevi erectiusculo à basi ramoso, ramis 1-cephalitis erectis bracteatis, foliis pinnatipartitis rachi lobisque linearibus apice setiferis et albo-callosis, capitulis antè anthesin nutantibus ovatis, invol. squamis inter. adpressis, ext. subpatulis. 2 in Hispaniae Valentiniæ incultis ad radices montium (Cav. L. Duf.!), in agri Murcici collibus cretaceis (Lag.), in Navarrâ austr. ad Peralta et Tudela (Duf.), et forte in Arabiâ (si Schimp. n. 827 hoc ritè referend.). Scorzonera pumila Cav. ic. 2. p. 19. t. 121. f. 2. mala. Sonchus scorzoneraeformis Lag. nov. gen. et sp. n. 313. Dufour! ann. sc. nat. bot. 1836. p. 49. Picridium cernuum L. Duf. in litt. Scorzonera pumila et Sonchus scorzoneraeformis Spreng. Scorz. glandulosa Pourr. ex Dufour. Achænia (immatura) levia cylindracea. Pappus pilosus. Invol. squamæ margine scariosæ. Habitus fere Podospermi. (v. s.)

2. Z. CHONDRILLOIDES, caule erecto paniculato-ramoso, foliis variè pinnatilobatis, infer. basi attenuatis, super. cordato-semiamplexicaulibus, lobis integris dentatis, pedicellis parcè bracteatis, capitulis erectis, invol. squamis adpressis apice subcallosis obtusis. 2 in Ægypti agris (Bové! Auch.!) et desertis circâ Kahiram (Forsk.), Rosettam et Alexandriam (Delil.!), Scheik propè Sachetto (Acerbi!), in Arabiâ petræa (Schimp. n. 208), in arvis arenosis circâ veterem Carthaginem (Desf.), in Siciliâ (Jan!) ad Girgenti et Cattania (Guss.) nec ut autumo in Galliâ et Hispaniâ. Scorzonera resedifolia Linn. sp. 1132. Vahl symb. 2. p. 87. non Retz. Leontodon mucronatum Forsk. descr. 144. Sonchus chondrilloides Desf. fl. atl. 2. p. 226. Sonchus Bocconi Jan! cat. 658. sp. 13. — Chondrilla Sicula, etc. Bocc. sic. 13. t. 7. f. A. et C. A. mal. quoad capit. Mirè variant folia incisuris integris aut dentatis, latis angustis. (v. s.)