

1. PICRIDIUM TINGITANUM. DESF.

P. annum; caule subfoliato, superne ramoso; foliis lanceolatis pl. pinnatifidis rarius integris; pedicellis subesquamosis; involuci squamis margine lato, albo, scarioso munitis, inferioribus obtusis mucrone brevi terminatis, subcorniculatis. (Ligulæ infernæ et in dorsi parte superiori pl. purpureo-brunneæ, supra tubum more Tolpidis barbatæ pl. pulchræ violaceæ, quod præter P. crystallinum in nullo alio observavi Picridio.)

Chondrilla tingitana floribus luteis, *Papaveris hortensis* folio, *Herm.*, *Lugdb.*, 657, t. 659.

Scorzonera tingitana. *Linn.*, *Sp. pl.*, ed. 1, p. 791, et ed. 2, p. 1114, et *Scorzonera orientalis*, *L. c.*, p. 1113.

Sonchus tingitanus *Papaveris* folio. *Tourn.*, *Inst.*, p. 474.

Sonchus tingitanus. *Lam.*, *Enc.*, 3, p. 397.

Picridium tingitanum. *Desf.*, *Atl.*, 2, p. 220. — *Buch*, *Canar.*, p. 147, et 175. — *DC.*, *Pr.*, 7, p. 182, excl. loco natali «Siciliæ» sec. ipsiss. Gussone Fl. sic. syn., 2, p. 393.

Picridium arabicum. *Hochst!* et *Steud.* in *Schimp. pl. arab.*, n. 883 certè *P. tingitani* var. est integrifolia. Cl. Hochstetter ipse in litt. rectè monet: «Forsan *P. tingitani* var. integrifolia (semin anon differunt).»

Picridium orientale. *DC.*, *Pr.*, 7, p. 182 et verosimiliter *Picridium hispanicum*. *Poir.* — *DC.*, *l. c.*

HAB. *Vulgaris* est in ins. Canariensibus: *Webb!* *Infierno Adexe*, *Fuente del Re Oro-tava Teneriffæ*. Specimina magna et pulchra in *Barranco de las Augustias* *Palmæ* sec. *Buch*, *l. c.*, p. 175. *Fuertaventura*: *Bourgeau!* n. 9.

Specimina canariensia sunt *palmaria spithamea*, *caulibus dichotome ramosis*, *erectis v. adscendentibus*, *foliis pinnatifidis*, *involuci squamis late albo-marginatis*, *inferioribus ad dorsi apicem corniculatis*.

DISTR. GEOGR. Stirps crat. mediterranei australis et Orientis, imò in Americam septentr. sec. specimen *pensylvanicum* herb. *Zeyher!* *introducta*, in hortis botanicis abundans.

In herbario habeo:

1. *Persia australis*. In fissuris rupium pr. pagum *Gere*, inter *Abuschir* et *Schiras*, 23 Mart. 1845: Kotschy I. pl. Pers. austr. ed. Hohenaker n. 28 et 87 (*P. orientale* DC. — Boiss.!). Planta caule humili submonocephalo, sine capitulo 1/3-5 polli. longo, esfoliato v. foliato, foliis integris v. pinnatifidis. — Arabia, in palmetis vallis *Fatme* prov. arabicæ *Hedschas* Febr. 1836: Schimper! n. 833. Planta dodrantalis, ramosa, foliis integris v. superficialiter sinuat's. — Barbaria prope *Gerbi* et *Saleeto*, vere anni 1846: Dr. Lorent! Plantæ palmates-spithameæ, subramosæ, foliis pinnatifido-pinnatipartitis.

2. PICRIDIUM INTERMEDIUM. C. H. SCH. BIP.

P. annum; caule subfoliato, pl. inferne ramoso; pedicellis pl. plurisquamosis; squamis involuci inferioribus acutis v. acuminatis, margine scarioso angustiore sordidè viridi-albente munitis; foliis obovato-oblongo-lanceolatis, subintegris, crebre denticulatis,

denticulis spinescentibus; flore concolore dilute aureo vel superne dorso subpurpurascente.

Variat :

α Janii, caule 1-2-pedali, subefoliato, dichotome ramoso. Huc specimina sicula, cretensis, hispanica et lusitanica.
 β gracilis, caule spithameo, gracili, subfoliato, 1-2-cephalo. Huc specimina canariensis, 5-7 poll. longa, quibus folia tenera, pleraque radicalia, rosulata, obovato-lanceolata, spinulose dentata, integra v. sinuata; caules graciles 1-5, erecti, 1-2-cephali; pedicelli squamosi, clavati; capitula parva, involuci squamæ inferiores dorsi apice corniculatæ, margine scarioso, albo-virente munitæ; flores pl. concolores, rarius dorsi ligulæ parte superiore subpurpurantes. Species intermedia *Picridium tingitanum* inter et *vulgare*, priori radice annua affinis, sed inter alia involuci squamis angustius et obscurius scariosis discrepans, posteriori magis affinis, sed diversa radice annua squamis latius scariosis, flore pl. concolore in *P. vulgari* dorso ligularum livide villato.

Sonchus intermedius Cristofori et Jan! Catal., p. 13, gen. 6 1/2 (anno 1832).

HAB. In ins. Canariensis cum *P. tingitano*.

DISTR. GEOGR. Stirps mediterranea; habeo e Siciliâ : Jan! Cf. DC. pr. VII, p. 182, qui stirpem hanc cum *P. lingulato* confundit; Cretâ : Sieber! cum *P. vulgari*; Lusitanâ in arvis primo vere, Martio 1839 : Welwitsch! n. 388 (*P. vulgare*); Hispanâ in lutosis reg. calidæ in monte Gibraltarico, 3 Apr. 1845 : Willkomm.! n. 570 (*P. vulgare*).

3. PICRIDIUM CRYSTALLINUM. C. H. SCH. BIP.

P. tingitanum β crispulum Webb! in litt.

HAB. In arenâ maris ad portulum oppiduli Guimar. Pili apice vesiculosi et tota planta micat veluti *Mesembryanthemum crystallinum* : Webb! in litt. Buena Vista, Teneriffæ : Webb!

DISTR. GEOGR. Stirps canariensis.

Species peculiaris esse videtur. Capitula certe *Picridio tingitano* similia. Involuci squamæ nempe late albo-scariosæ, ad dorsi apicem, exceptis intimis, corniculatæ, flores supra tubum pilosum violacei et ligula dorso subpurpurascens. Pedicelli in axi foliorum supremorum orientes, pollicares, efolioti, squama una alterave notata cordata. Achænia nondum matura, attamen pappus basi in annulum concretus caducissimus.

Differt tamen a *P. tingitano* :

1. Radice fusiformi 3-4 poll. longa, superne 3-4 lin. diametro metiente, lignescente, pluricauli.
2. Caulibus cum capitulis speciosis tantum 2 poll. longis, inferne suffruticosentibus, 2-3 lin. diametro metientibus, ligno duro, amarissimo.
3. Foliis confertissimis innumeris, cæspitosis, linear-lanceolatis, pinnatipartitis, cum pinnis oblongis, dentibus spinescentibus innumeris, inæqualibus conferte exasperatis, crispulis, et pilis simplicibus, apice in vesiculam ovalem dilatatis, confertissimis, albo-cinereis. Corpusculi similes albentes, sessiles, ovales, inflati, etiam in foliis *P. tingitani* et quandoque *P. vulgaris* sparsi observantur, quales in nullis aliis observavi Cichoriaceis, et quæ potius ad regnum animale spectare videntur.

4. PICRIDIUM LIGULATUM. VENT.

P. infernè suffruticosum; squamis ovato-lanceolato-linearibus, obtusis, herbaceis, mar-